

Dicloxacillin Arrow 250 mg og 500 mg kapsler, hårde

Dicloxacillinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dicloxacillin Arrow til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dicloxacillin Arrow
3. Sådan skal du tage Dicloxacillin Arrow
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

250 mg: Ugennemsigtig kapsel med hvid bund og top.
500 mg: Tofarvet, ugennemsigtig kapsel med hvid bund og lysegrøn top.

Dicloxacillin Arrow har en bakteriedræbende virkning og anvendes mod infektioner forårsaget af en bestemt form for stafylokokker.

Lægen kan have givet dig Dicloxacillin Arrow for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DICLOXACILLIN ARROW

Tag ikke Dicloxacillin Arrow

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for penicillin, cephalosporin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dicloxacillin Arrow

- Tal med lægen, inden du tager Dicloxacillin Arrow, hvis du tager cefalosporiner, cephamyciner, 1-oxa-beta-lactamer og carbapenemer (midler til behandling af infektionssygdom).
- Tal med lægen, hvis du er ældre og har gennemgået hofteoperation.
- Tal med lægen, hvis dit barn er nyfødt og skal tage Dicloxacillin Arrow.

Du skal altid oplyse ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dicloxacillin Arrow. Vær opmærksom på at lægen højst sandsynlig vil

foretage visse kontrolundersøgelser både før og under behandlingen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Lægemidler med probenecid (mod urinsur gig), da det kan forøge koncentrationen af dicloxacillin i blodet.
- P-piller, da dicloxacillin i sjældne tilfælde kan nedsætte effekten af disse.
- Methotrexat (gigtmedicin), da dicloxacillin kan forårsage øget risiko for bivirkninger af methotrexat.
- Wafarin/dicumarol (blodfortyndende medicin), da dicloxacillin kan nedsætte effekten af disse.

Brug af Dicloxacillin Arrow sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Dicloxacillin Arrow i forbindelse med et måltid. Kapslerne skal synkes hele med mindst et halv glas vand og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dicloxacillin Arrow. Tal med lægen.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Dicloxacillin Arrow, da Dicloxacillin Arrow går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dicloxacillin Arrow påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DICLOXACILLIN ARROW

Tag altid Dicloxacillin Arrow nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 500 mg 3 gange dagligt. Ved svære og alvorlige infektioner kan den daglige dosis øges til maksimalt 6 gram.

Børn: 12,5-25 (-50) mg/kg/døgn fordelt på lige store doser 3 gange daglig.

Da der er begrænset erfaring med brug til præmature og nyfødte, kan der ikke gives doseringsanbefalinger

til denne aldersgruppe. Det frarådes at anvende kapsler til børn under 20 kg.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Kapslerne skal synkes hele med mindst et halvt glas vand og ikke i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosis skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. Følg altid lægens anvisning. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Dicloxacillin Arrow kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Dicloxacillin Arrow end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering kan være mave-tarm gener, forstyrrelser i saltbalancen, krampes, nedsat bevidsthed samt nyresvigt.

Hvis De har glemt at tage Dicloxacillin Arrow

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dicloxacillin Arrow kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Anafylaktiske reaktioner. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Vejrtrækningsbesvær, astmatisk vejrtrækning, Hævelse af svælget. Cholestatisk hepatitis. Udslæt (nældefeber) og hævelser. Forskellige former for nyresygdommet evt. medførende nedsat nyrefunktion. Blod i urinen, skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen. Smerter i svælg, svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Øget følsomhed. Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter. Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Forhøjet serum creatinin. Forbigående, asymptomatisk øgning af alkaliske fosfataser, ASAT og ALAT.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. Diaré, kvalme, opkastninger. Mavesmerter og luft i maven. Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. Nældefeber og kløe.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. Feber

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Svampeinfektion i mundhule og i underlivet. Muskeltrækninger og utilpashed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.meldenbivirkning.dk>

5. OPBEVARING

Opbevar Dicloxacillin Arrow utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Dicloxacillin Arrow ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Dicloxacillin Arrow i original beholder, tæt tilsluttet, da det er følsomt for fugt.

Brug ikke Dicloxacillin Arrow efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dicloxacillin Arrow, 250 mg, kapsler, hårde indeholder:

- Aktivt stof: dicloxacillinatrium
- Øvrige indholdsstoffer:
Kapsel indhold: Magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.
Kapsel: Gelatine og titandioxid (E171).

Dicloxacillin Arrow, 500 mg, kapsler, hårde indeholder:

- Aktivt stof: Dicloxacillinatrium
- Øvrige indholdsstoffer:
Kapsel indhold: Magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.
Kapsel: Gelatine og titandioxid (E171), patent blue V (E131) og Quinolingult (E104)

Udseende og pakningsstørrelser

Dicloxacillin Arrow, 250 mg, kapsler, hårde: 30 kapsler i glasflaske

Dicloxacillin Arrow, 500 mg, kapsler, hårde: 30, 50 eller 100 kapsler i glasflaske

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Arrow Pharma ApS, Sankt Pedres Stræde 2, 1, 4000 Roskilde

Fremstiller:

Laboratoria Reig Jofre S.A, c/Jarama s/n Pol.ind Toledo 45007, Spain

Arrow Pharm (Malta) Ltd., HF62 Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 06, Malta

Denne indlægsseddel blev senest godkendt { 11/2009 }

229565