

Acular® 5 mg/ml, øjendråber, opløsning

Ketorolactrometamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Acular® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acular®
3. Sådan skal du bruge Acular®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Acular® er et middel, der kaldes NSAID. Det dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation).

Du skal bruge Acular® til

- behandling af allergisk øjenbetændelse
- forebyggelse og behandling af betændelse i øjet efter øjenoperation
- behandling af kronisk blod/væskeansamling (ødem) i bagerste del af øjet.

Lægen kan have givet dig Acular® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ACULAR®

Brug ikke Acular®, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for ketorolactrometamol eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har fået overfølsomhedsreaktioner som astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer (NSAID).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Acular®

Tal med lægen, inden du bruger Acular®, hvis du

- har mistanke om betændelse i øjet. Acular® kan sløre symptomerne på infektion
- har tendens til blødning fra hud eller slimhinder
- bruger andre øjendråber mod betændelse i øjet (med binyrebarkhormoner)
- har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer
- har sygdom i øjets hornhinde
- har tørre øjne
- har diabetes eller leddegigt (reumatoid arthritis).

Kontakt straks lægen

- hvis du får uklart syn og evt. smerter i øjet.

Vær opmærksom på følgende

- Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når De har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med anden medicin til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormon.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Acular® og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Acular® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Acular® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acular® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Acular®

Acular® indeholder benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger øjendråberne, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ACULAR®

Brug altid Acular® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

- Allergisk øjenbetændelse: 1 dråbe 4 gange dagligt i op til 6 uger.
- Forebyggelse og behandling af øjenbetændelse efter øjenoperation: 1 dråbe 3 gange dagligt i 3-4 uger, første gang 24 timer før operation.
- Kronisk blod/væskeansamling (ødem) i øjet: 1 dråbe 4 gange dagligt i 2-3 måneder.

Børn skal normalt ikke bruge Acular®.

Brugsanvisning



1. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.



2. Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.



3. Tryk på flasken for at udløse en dråbe i øjet.



4. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 30 sek.

For at undgå forurening bør dråbespiden ikke berøres. Skru hættten på efter brug.

Hvis du har brugt for meget Acular®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Acular®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Acular®. En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.

Hvis du ved et uheld indtager Acular skal du drikke rigelig med væske og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Acular®

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Acular®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Acular® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Smerter og uklart syn pga. skader på hornhinden. Det kan i nogle tilfælde udvikle sig til et hul på hornhinden. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma.
- Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Øjenirritation, svien eller brændende fornemmelse i øjnene efter drypning.
- Øjensmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Smerter i øjet pga. overfladisk betændelse i hornhinden. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
- Allergisk reaktion i øjnene.
- Væskeansamling (ødem) i øjet og/eller øjenlåg.
- Øjenkløe, røde øjne pga. øget blodtilførsel.
- Infektion eller betændelse i øjet. Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Sår på hornhinden eller infiltrator i hornhinden. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hovedpine.
- Uskarpt og/eller nedsat syn.
- Tørhed i øjne.
- Kraftigt tåreflåd.
- Smerter i øjet, rødme i øjet, sløret syn pga. betændelse i regnbuehinden. Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemedelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemedelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Acular® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Acular® ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Acular® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug senest Acular® 4 uger efter åbning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Acular® 5 mg/ml øjendråber, opløsning indeholder

- Aktivt stof: ketorolactrometamol.
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid-opløsning, dinatriumedetatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre eller natriumhydroxid (til justering af pH), octoxinol 40, rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Acular® er en klar farveløs til svag gul opløsning i en plastflaske med dråbeanordning.

Acular® findes i en pakning med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Acular® er et registreret varemærke, der tilhører Allergan, Inc.