

Indlægsseddel: Information til brugeren

Catapresan® 25 mikrogram, tabletter

Clonidinhydrochlorid

04-2015
P418156-4

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Catapresan®
3. Sådan skal du tage Catapresan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Catapresan® påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene i kroppen.

Du kan tage Catapresan® til

- forebyggelse af migræne. Catapresan® kan ikke anvendes ved akutte migræneanfald.
- behandling af hedsure i overgangsalderen, når du ikke kan tåle behandling med østrogen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Catapresan®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Catapresan® hvis du

- er allergisk over for clonidinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Catapresan® (angivet i afsnit 6).
- lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
- har intolerans overfor visse sukkerarter (Se afsnittet "Catapresan® indeholder lactose og saccharose").

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Catapresan®, hvis du har

- uregelmæssig hjerterytme eller andre problemer med hjertet.
- forstyrrelser i blodomløbet i kroppen.
- depression.
- nervebetændelse (polyneuropati).
- forstoppelse.
- nedsat nyrefunktion (Catapresan® udskilles via nyrene).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Catapresan®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Catapresan® bør ikke anvendes sammen med methylphenidat (eks. Ritalin). Spørg lægen eller på apoteket.

Catapresan® kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan have betydning, hvis du bruger kontaktlinser.

Du må ikke pludselig stoppe med behandlingen af Catapresan®. Se afsnittet "Hvis du holder op med at tage Catapresan®".

Brug af anden medicin sammen med Catapresan®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. betablokkere eller vanddrivende medicin).
- medicin til lokal behandling af erektil dysfunktion (phentolamin).
- sovemedicin.
- beroligende medicin.
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).
- medicin mod sindslidelser (spørg din læge).

Vær opmærksom på at alkohol, beroligende medicin samt sovemedicin kan forstærke den deprimerende effekt på centralnervesystemet.

Brug af Catapresan® sammen med mad og drikke

Du kan tage Catapresan® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Catapresan® med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Catapresan®, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Catapresan®, da clonidin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Catapresan® kan give bivirkninger, som svimmelhed, døsighed og/eller synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Catapresan® indeholder lactose og saccharose

Catapresan® indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Catapresan®

Tag altid Catapresan® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften). Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behandling kan dosis øges op til 3 tabletter 2 gange daglig. Fuld virkning kan forventes efter 2 – 4 ugers behandling.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke få Catapresan® tabletter.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Catapresan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Catapresan®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tegn på overdosering kan være døsighed, langsom puls, lavt blodtryk med svimmelhed, besvimelse, sammentrækning af pupillen, lav kropstemperatur, søvnliggende bevidsthedssvækkelse - herunder koma, forstyrrelser i hjerterytmen og diarré. Du kan også opleve vejtrækningsbesvær og uregelmæssig vejtrækning, langsomt åndedræt, blive bevidstløs og få for højt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Catapresan®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Catapresan®

Du bør nedtrappe Catapresan® over en periode på 2 – 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Catapresan®. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Catapresan® kan medføre rastløshed, hjertebanken, rystelser, hurtig blodtryksstigning, nervøsitet, hovedpine og kvalme.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hvide, "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Uregelmæssighed som giver en langsommere hjerterytme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Svimmelhed.
- Sløvhed.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Catapresan® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Hovedpine.
- Forstoppelse, kvalme, opkastning.
- Smerter i spytkirtlerne.
- Træthed.
- Impotens.
- Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Søvnforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kløe, hududslæt, nældefeber.
- Utilpashed.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

- Sanseforstyrrelser. Mareridt.
- Føleforstyrrelser i arme og ben.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Stigning i blodsukkerniveauet.
- Reduktion af tårevæskeproduktionen (OBS! på kontaktlinser).
- Tørhed i næseslimhinden.
- Tilstand som stærkt ligner en tilstopning af tyktarmen, men en sådan hindring kan ikke påvises, selv ikke ved operation.
- Hårtab.
- Udvikling af bryster hos mænd.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Nedsat evne til at se skarpt.
- Forvirring.
- Nedsat sexlyst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: ssst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Catapresan® utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Catapresan® ved almindelig temperatur.

Tag ikke Catapresan® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Catapresan® indeholder:

Aktivt stof: Clonidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, lactose, majsstivelse, silica kolloid, povidon, stivelse, magnesiumstearat, saccharose, talcum, akaciegummi, carnaubavoks, macrogol 6000, hvid voks, indigotin (E132) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tabletterne er runde, bikonvekse, blå og sukkerovertrukne.

Pakningsstørrelser

Catapresan® fås i en pakningsstørrelse á 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømmervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømmervej 9

6710 Esbjerg V

Catapresan® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015