

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

XYLOCAINE®

10 mg/dosis kutanspray, opløsning

Lidocainhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Xylocaine® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Xylocaine® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine®.
3. Sådan skal du bruge Xylocaine®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Xylocaine®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Xylocaine® og hvad du skal bruge det til

- Xylocaine® virker lokalbedøvende på hud og slimhinder.
- Lægen eller tandlægen kan bruge Xylocaine® til lokalbedøvelse ved forskellige undersøgelser eller indgreb.

Lægen kan have givet dig Xylocaine® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocaine®**Brug ikke Xylocaine®**

- hvis du er overfølsom over for lidocain eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er overfølsom over for lokalbedøvende medicin af samme type som Xylocaine®.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Xylocaine®

- Hvis du har brugt Xylocaine® i mund eller svælg, skal du være særlig forsigtig. Du bliver følelsesløs, og du kan få maden galt i halsen. Du bør derfor ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen. Hvis din tunge eller gummer er følelsesløse, er der risiko for, at du kommer til at bide dig selv.
- Xylocaine®, kutanspray er skadelig for alkoholikere. Da Xylocaine® indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun bruge Xylocaine® efter aftale med lægen.

Tal med din læge, inden du bruger Xylocaine®, hvis:

- Du har en hjerte- karsygdom eller har forstyrrelser i hjerterytmen.
- Du lider af hjertesvigt.
- Du er ældre.
- Du generelt har dårligt helbred.
- Du har dårlig lever.
- Du har dårlige nyrer.
- Du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet.
- Du har langsom puls.
- Du har haft udbredte forbrændinger, diaré eller voldsom opkastning gennem længere tid, der har ført til tab af væske og reduktion i blodmængden, og du derved har udviklet kredsløbssvigt (hypovolæmisk shock).
- Du lider af porfyri, som er en sjælden stofskiftesygdom.
- Du vil bruge Xylocaine® på åbne sår, på slimhinder, på forbrændinger eller på områder med betændelse.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (antiarytmika f.eks. amiodaron), skal du tale med din læge, før du bruger Xylocaine®.
- Xylocaine® samtidig med anden lignende lokalbedøvende medicin.
- En bestemt type medicin mod depression (fluvoxamin).

Xylocaine® indeholder alkohol. Du må ikke bruge Xylocaine®, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Xylocaine®, og/ eller Xylocaine® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Xylocaine® sammen med mad og drikke

Hvis Xylocaine® har været brugt i mund eller svælg, bør du ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen, da du kan få maden galt i halsen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Xylocaine® indeholder alkohol. Du må kun bruge Xylocaine® under graviditet efter aftale med lægen.

Amning:

Du kan amme selv om du bruger Xylocaine®. Du skal ikke bruge Xylocaine® på brystvorten, lige før du ammer. Har du brugt det forinden, er det vigtigt, at du renser området omkring vorten omhyggeligt med vand inden amningen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis kan Xylocaine® kortvarigt forstyrre bevægelse og koordination og derved påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xylocaine®

Xylocaine® indeholder alkohol. Du må ikke bruge Xylocaine®, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

3. Sådan skal du bruge Xylocaine®**Den sædvanlige dosis er****Voksne:**

Lægen tilpasser dosis til dig.

Virkningen indtræder sædvanligvis inden for 1-3 minutter og varer ca. 10-15 minutter.

Børn:

Du bør ikke bruge Xylocaine® til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion og svært nedsat leverfunktion.

Brug altid Xylocaine® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Brugsanvisning

Du skal bruge Xylocaine® kutansprayopløsning sammen med det vedlagte sprayrør.

Spray Xylocaine® direkte på huden eller slimhinden.

Før du begynder at bruge sprayopløsningen, skal du anbringe sprayrøret i pumpeventilen. Du må ikke afkorte sprayrøret.

Du kan rengøre sprayrøret ved kogning.

Beholderen med 50 ml Xylocaine® kutansprayopløsning svarer til ca. 500 doser.

Hvis du har brugt for meget Xylocaine®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocaine®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Følelsesløshed i tungen, ved læberne og rundt om munden, uklarhed, øget følsomhed over for lyd, tinnitus, synsforstyrrelser og muskeltræknings. For at undgå efterfølgende nævnte alvorlige bivirkninger bør du tage disse tidlige tegn på overdosering alvorligt og stoppe med at bruge Xylocaine®.

I alvorlige tilfælde ses bevidstløshed og krampeanfald efterfulgt af lavt iltindhold i blodet og forøget kuldioxid i blodet der kan give uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser. Der er yderligere set svær nedsat blodtryk, langsom puls, hjerterytmeforstyrrelse og kredsløbssvigt (shock).

4. Bivirkninger

Xylocaine® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergiske reaktioner.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Lokal irritation, forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Xylocaine®

- Opbevar Xylocaine® utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Xylocaine® ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Xylocaine® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Xylocaine®, 10 mg/dosis kutanspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Lidocain 10 mg/dosis.

Øvrige indholdsstoffer:

Ethanol 95%, macrogol 400, saccharin, bananessens, menthol og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Xylocaine® 10 mg/dosis kutanspray opløsning fås i pakninger med 1x50 ml glasflaske med vedlagt sprayrør.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

I Danmark markedsføres Xylocaine® også som Xylocain®.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Xylocaine® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca-koncernen.



(03) 1132002

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700