

Perlutex® Vet. 5 mg

Tabletter til hund og kat

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

Fremstillere ansvarlige for batchfrigivelse:

Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate,
Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien
Recipharm Limited, Vale of Bardsley, Ashton-under-Lyne, Lancashire,
OL7 9RR, Storbritannien

Veterinærlægemidlets navn:

Perlutex Vet. 5 mg tabletter til hund og kat
Medroxyprogesteronacetat

Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer:

1 tablet indeholder:

Aktivt stof: Medroxyprogesteronacetat

Hjælpestoffer: Laktosemonohydrat, majsstivelse, talk, gelatine, magnesiumsterat.

Indikationer:

Hund: Kortvarig udsættelse af løbetid.

Afbrydelse af løbetid.

Kat: Langvarig udsættelse af løbetid.

Kontraindikationer:

Perlutex Vet. bør ikke anvendes i tilfælde af seksuelt umodne dyr, drægtige og diegivende dyr eller dyr med tumorer, sukkersyge, akromegali, sygelige tilstande i vagina, uterus, lever, bugspytkirtlen, mælkekirtlerne og reproduktionssystemet.

Længere tids udsættelse af løbetiden må ikke starte under løbetiden, da dette kan øge risikoen for bivirkninger i livmoderen, dette gælder især hos ældre dyr.

Bivirkninger:

Følgende uønskede bivirkninger kan forekomme, sædvanligvis kort tid efter påbegyndelse af behandlingen:

- Øget appetit og fedme. Det kan blive nødvendigt at kontrollere fødeindtagelsen.
- Adfærdsåendringer.
- Forstørrelse af brystkirtlerne.

Symptomerne er sædvanligvis forbigående.

Sjældne bivirkninger:

- Cystisk forøgelse af slimhinden i livmoderen.
- Mælkekirtel tumor.
- Suppression af binyren.
- Sukkersyge.
- Akromegali.

Risikoen for bivirkninger eksisterer specielt hvis produktet bruges over lang tid.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: <http://www.meldenbivirkning.dk>

E-mail: dkma@dkma.dk

Dyrearter:

Hund og kat.

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej:

Hund:

Afbrydelse og kortvarig udsættelse af brunst: 2 tabletter daglig i 4 dage, derefter 1 tablet daglig i 14 dage. Dobbelt dosis til hunde over 25 kg.

Kat:

Langvarig udsættelse af brunst: 1 tablet pr. uge så længe udsættelse ønskes. Behandlingen må ikke indledes når katten er i løbetid.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt anvendelse:

Det er tilrådeligt at monitorere ældre dyr for udvikling af sukkersyge.

Tilbageholdelsestid:

Ikke relevant.

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken.

Særlige advarsler:

Når brunsten hos hund har været afbrudt med Perlutex Vet. vil den næste løbetid komme tidligere end forventet.

Efter behandling med Perlutex Vet. hos kat kommer næste brunst med varierende intervaller.

Længerevarende afbrydelse af brunst (afbrydelse af mere end en brunst) hos avlsdyr kan ikke anbefales.

Hos nogle hunkatte kan det være svært at registrere, hvornår katten er tæt på brunst og hvornår den er uden for brunst, tidspunktet kan blive forvekslet med drægtighed. Det kan være nødvendigt at isolerer katten for at konstatere, hvornår den er i brunst.

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne:

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Dato for seneste revision af indlægssedlen: 14/03/2018

Andre oplysninger:

Blister pakning: 20 stk, 60 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

