

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarithromycin "2care4" 500 mg filmovertrukne tabletter

Clarithromycin

09-2011
P420131-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Clarithromycin "2care4" til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin "2care4"
3. Sådan skal du tage Clarithromycin "2care4"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Clarithromycin "2care4" er et antibiotikum og tilhører gruppen, der kaldes makrolider. Det stopper væksten af visse bakterier. Clarithromycin "2care4" anvendes til behandling af betændelser forårsaget af clarithromycin-følsomme bakterier i f.eks:

- Bronkier og lunger
- Bihuler og svælg
- Hud og slimhinder
- Mavesår forårsaget af bakterien *Helicobacter pylori*.

Lægen kan have givet dig Clarithromycin "2care4" for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITHROMYCIN "2CARE4"

Tag ikke Clarithromycin "2care4"

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for clarithromycin eller andre lægemidler der tilhører samme stofgruppe (makrolider) eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har nedsat kaliumindhold i blodet.
- hvis du tager ergotamin (mod migræne).
- hvis du tager cisaprid (mavemedicin).
- hvis du tager pimozid (antipsykotisk medicin).
- hvis du tager terfenadin og astemizol (mod allergi).
- hvis du tager simvastatin eller atorvastatin (mod forhøjet kolesterol).
- hvis du har svært nedsat leverfunktion i kombination med nedsat nyrefunktion.
- hvis du har hjerteproblemer.
- hvis du tager sekalealkaloider (til sammen-trækning af livmoderen).

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarithromycin "2care4"

- Tal med lægen, hvis du
- har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 - er allergisk overfor lincomycin eller clindamycin (antibiotika).
 - har eller har haft problemer med hjertet.
 - har haft nedsat kalium- eller magnesiumindhold i blodet.
 - har eller har haft alvorlig muskelsvækkelse (myasthenia gravis).
 - udvikler voldsom diarré under eller efter behandling med Clarithromycin "2care4".

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod / som

- allergi (terfenadin, astemizol).
- psykiske lidelser (pimozid).
- mavelidelser (cisaprid).
- migræne (ergotalkaloider).
- søvnløshed (alprazolam, triazolam, midazolam).
- hjertelidelser (digoxin, kinidin, disopyramid).
- astma (theophyllin).
- er blodfortyndende (warfarin).
- forhøjet kolesterol (lovastatin, simvastatin, cerivastatin, atorvastatin).
- hæmmer immunforsvaret (ciclosporin, sirolimus, tacrolimus).
- antibiotika (rifampicin, rifabutin, andre makrolider).
- virus (efavirenz, ritonavir, zidovudin).
- epilepsi (phenytoin, carbamazepin, fenobarbital).
- depression (naturlægemidlet prikbladet perikum).
- sukkersyge (repaglinid).
- urinsyreigt (colchicin).
- forhøjet blodtryk eller manglende erektion (sildenafil).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Clarithromycin "2care4" efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Clarithromycin "2care4" efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarithromycin "2care4" kan give bivirkninger som svimmelhed, forvirring og desorientering, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CLARITHROMYCIN "2CARE4"

Tag altid Clarithromycin "2care4" nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne og unge (12-18 år)

Den normale dosis er 250 mg 2 gange dagligt. Dosis kan øges til 500 mg 2 gange dagligt ved svære infektioner.

Mavesår forårsaget af bakterien *Helicobacter pylori*:

500 mg 2 gange dagligt i kombination med passende antibiotika og medicin til hæmning af syredannelse.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn under 30 kg må normalt ikke få Clarithromycin "2care4" 500 mg filmovertrukne tabletter. Der findes andre lægemiddelformer, som f.eks. suspension, til børn.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis ved stærkt nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Indtagelsesmåde

Til oral anvendelse. Tag tabletterne sammen med et glas vand. Tabletterne kan tages sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarigheden kan være varierende. Behandlingens normale varighed er 6 – 14 dage. Behandlingen bør fortsætte i mindst 2 dage efter, at symptomerne har fortaget sig. I tilfælde af streptokok-infektioner bør behandlingen minimum vare 10 dage.

Hvis du har taget for mange Clarithromycin "2care4"

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Clarithromycin "2care4" end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er gener fra mave og tarm.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin "2care4"

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin "2care4"

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Clarithromycin "2care4" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Leverbetændelse, gulsot, galdestop. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Psykoser / sindslidelser. Kontakt lægen.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvortlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
- Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt (særligt hvis du i forvejen har leversygdom) kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

- 1 og 10 ud af 100 patienter.
- Svamp i munden.
 - Hovedpine.
 - Forandret lugtesans.
 - Kvalme, diarré, opkastning, mavesmerter, sure opstød / halsbrand.
 - Mundbetændelse, betændelse i tungen, misfarvning af tænder og tunge - ophører efter endt behandling, smagsændring f.eks. metalsmag eller bitter smag.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Nældefeber, lette hududslæt.
- Forbigående leverfunktionsforstyrrelse.
- Smerter i leddene, muskelsmerter.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Susen for ørerne (tinnitus).

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Angst.
- Søvnløshed.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Manglende orientering, ændret personlighed, ubehagelige drømme.
- Forvirring.
- Svimmelhed.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

- Tabt hørelse, som vender tilbage efter ophørt behandling.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).

Clarithromycin "2care4" kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Clarithromycin "2care4" ved almindelig temperatur. Tag ikke Clarithromycin "2care4" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarithromycin "2care4" 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Clarithromycin.
Øvrige indholdsstoffer: Croscarmelloseatrium, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid vandfri silica, povidon (K30), stearinsyre, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, propylenglycol, hydroxypropylcellulose, titandioxid (E 171), quinolingult (E 104) og vanillin.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Clarithromycin "2care4" 500 mg filmovertrukne tabletter er gule, ovale tabletter med delekærv og mærket "C 2" på den ene side.

Pakningsstørrelser

Clarithromycin "2care4" fås i pakningsstørrelser á 14 og 21 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Clarithromycin "2care4" svarer til Clarithromycin Ranbaxy.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011