

Indlægsseddel

Information til brugeren

Sebiprox 1,5 % shampoo

Ciclopiroxolamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Sebiprox.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sebiprox
3. Sådan skal du bruge Sebiprox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sebiprox shampoo indeholder det aktive stof ciclopiroxolamin, der er et svampemiddel.

Sebiprox bruges til behandling af skæl i hovedbunden.

Hvis din læge har sagt at du skal bruge Sebiprox for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sebiprox

Brug ikke Sebiprox, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for ciclopiroxolamin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sebiprox

- Som for al anden shampoo, bør du undgå at få Sebiprox shampoo i øjnene. Får du ved et uheld Sebiprox i øjnene, så skyl grundigt med vand.
- Sebiprox kan i sjældne tilfælde give hudirritation. Hvis huden er irriteret i længere tid, bør behandlingen afbrydes.

Der er i sjældne tilfælde set misfarvning af håret, især hvor håret er kemisk skadet, gråt eller hvidt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Sebiprox samtidig med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Sebiprox under graviditet.

Amning

Du kan bruge Sebiprox, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sebiprox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sebiprox shampoo

Sebiprox shampoo indeholder parfume (AF17050), der indeholder dipropylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Sebiprox

Hvis din læge har ordineret Sebiprox shampoo til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug af denne medicin

- Den sædvanlige dosis af Sebiprox shampoo er brug 2-3 gange om ugen.
- Den anbefalede behandlingsperiode er 4 uger.
- Brug en mild shampoo ind i mellem behandlinger med Sebiprox shampoo.

Børn

Du må kun bruge Sebiprox til børn efter aftale med lægen.

Sådan bruges Sebiprox shampoo

1. Fugt håret og kom så meget shampoo i håret, at der dannes rigeligt skum.
2. Hovedbund og områderne omkring masseres kraftigt med fingerspidserne.
3. Derefter skylles håret grundigt igennem og behandlingen gentages.
4. Shampooen skal forblive i kontakt med hovedbunden i 3-5 minutter.

Hvis du har glemt at bruge Sebiprox

- Brug Sebiprox shampoo næste gang du vasker hår.

Hvis du har brugt for meget Sebiprox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Sebiprox shampoo, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Sebiprox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Hudirritation.
- Rødme af huden.
- Kløe.

Tal med lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Sebiprox ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Sebiprox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Sebiprox 1,5 % shampoo indeholder:

Aktivt indholdsstof: ciclopiroxolamin, svarende til 1,50 g ciclopiroxolamin i 100 g shampoo.
Øvrige indholdsstoffer: Natriumlaurylethersulfat 70 %, cocamidopropylbetain, dinatriumphosphatdodecahydrat, citronsyremonohydrat, coconut diethanolamin, hexylenglycol, oleylalkohol, polysorbat 80, polyquanternium-10, parfume AF17050 (indeholder dipropylenglycol), natriumhydroxid, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Sebiprox shampoo fås i en plastikflaske med skruelåg. Hver flaske ligger i en karton.

Pakningsstørrelser

Sebiprox shampoo fås i pakningsstørrelserne 60 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml eller 500 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park
Sligo
Irland

Repræsentant i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2010.

Stiefel logo