

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Elocom® 0,1% kutanopløsning

mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Elocom® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom®
3. Sådan skal du bruge Elocom®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Elocom® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Elocom® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have givet dig Elocom® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ELOCOM®

Brug ikke Elocom®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svampe, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Elocom® mod

- en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
- betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- bumser eller på områder med bumser.
- sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.
- Kløe ved anus og kønsorganerne.
- Friktionsudslæt.
- Skoldkopper
- Tuberkulose
- Syfilis
- Vaccinationsreaktioner
- Sår eller på beskadiget hud

Vær ekstra forsigtig med at bruge Elocom®

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.

- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Du bør ikke bruge Elocom® rundt om øjnene.
- Undgå at få Elocom® i øjnene.
- Hvis du har brugt Elocom® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocom® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocom®, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocom®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Elocom® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocom® efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Elocom® på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Elocom®

Elocom® indeholder propylenglycol som kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ELOCOM®

Brug altid Elocom® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne

Påsmør Elocom® i et tyndt lag én gang dagligt.

Kutanopløsningen bruges normalt på meget behårede hudområder.

Børn

Du må kun bruge Elocom® til børn efter aftale med lægen.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne. Du kan evt. bruge handsker til påsmøring.

Undgå at få Elocom® i øjnene.

Hvis du har brugt for meget Elocom® kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocom®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Ved langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter

på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Elocom®

Smør et tyndt lag Elocom® på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Hvis du holder op med at bruge Elocom®

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom®, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis det er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Elocom® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadecomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Betændelse i det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker. Tal med lægen.
- Strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i hårsække.
- Tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
- Overfølsomhed over for det aktive stof i Elocom®.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Svien.
- Brændende følelse
- Kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Sløring af betændelse i huden.
- Forværring af betændelse i huden.
- Tydelige små blodkar i huden.
- Rødmen af huden.
- Smerte/reaktion på applikationsstedet
- Infektion, bylder.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Bumser.
- Kontakteksem
- Øget pigmentering af huden
- Overflødig hårvækst

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocom® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Elocom® 0,1% kutanopløsning indeholder:

- Aktivt stof: Mometasonfuroat 0,1% (1 mg/g).
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, isopropylalkohol, rensed vand, hydroxypropylcellulose, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, fortyndet phosphorsyre.

Pakningsstørrelser

Elocom® kutanopløsning fås i pakninger med 60 ml eller 2x60 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Elocom® er et registreret varemærke, der tilhører Schering Corporation.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk