

Indlægsseddel

Information til brugeren

Sebiprox 1,5 % shampoo

Ciclopiroxolamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Sebiprox shampoo.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter fire ugers behandling.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sebiprox
3. Sådan skal du bruge Sebiprox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sebiprox shampoo indeholder det aktive stof ciclopiroxolamin, der er et svampemiddel.

Sebiprox anvendes til behandling af skæl i hovedbunden (seborisk dermatitis).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sebiprox

Brug ikke Sebiprox:

- hvis du er **allergisk** (overfølsom) over for ciclopiroxolamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sebiprox shampoo (angivet i pkt. 6).

Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apoteket, inden du begynder at bruge Sebiprox shampoo.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sebiprox shampoo

- Sebiprox shampoo er kun til udvortes brug.
- Hvis du har gråt eller hvidt hår eller hvis dit hår er kemisk skadet (fx pga. hårfarve), bør du tale med lægen inden du bruger denne shampoo, da Sebiprox i sjældne tilfælde kan medføre misfarvning af håret.
- **Anvendelse af Sebiprox anbefales ikke til børn under 12 år**, da sikkerhed og virkning i denne aldersgruppe ikke kendes.
- **Undgå at få Sebiprox shampoo i øjnene, da det kan medføre svien og irritation i øjnene.** Får du ved et uheld Sebiprox i øjnene, så **skyl** med vand.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Der findes ingen information om sikkerheden ved brug af Sebiprox shampoo hos gravide.

- Tal med lægen, hvis du er gravid eller hvis du planlægger at blive gravid.
- Tal med lægen, hvis du bliver gravid mens du er i behandling med Sebiprox shampoo.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Sebiprox shampoo går over i modermælken. Hvis du ammer, skal du tale med lægen før du bruger Sebiprox shampoo.

Hvis du ammer dit barn mens du bruger Sebiprox shampoo, er det vigtigt at du er omhyggelig med at vaske alle rester af Sebiprox shampoo af brystet efter bad, før du begynder at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sebiprox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sebiprox shampoo

Sebiprox shampoo indeholder parfume (AF17050), der indeholder dipropylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Sebiprox

Brug altid Sebiprox nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug af denne medicin

- Den anbefalede dosis af Sebiprox shampoo er anvendelse 2-3 gange om ugen i 4 uger.
- Brug kun Sebiprox shampoo i hår og hovedbund samt hågrænsen, hvis den også er berørt.
- Brug en mild shampoo ind i mellem behandlinger med Sebiprox shampoo.

Sådan bruges Sebiprox shampoo

1. Fugt håret.
 2. Kom så meget Sebiprox shampoo i håret, at det dækker hår og hovedbund samt hågrænsen, hvis den også er berørt.
 3. Masser omhyggeligt hovedbund og områderne omkring med fingerspidserne.
 4. Skyl hår og hovedbund grundigt igennem.
 5. Gentag trin 2-4. Sebiprox shampoo skal have kontakt med hovedbunden i 3-5 minutter i alt, fordelt på de to behandlinger.
- Undgå at få Sebiprox shampoo i øjnene. Hvis du får shampoo i øjnene, skal du skylle grundigt med rent vand.

Hvis du kommer til at sluge Sebiprox shampoo

Indholdsstofferne i Sebiprox formodes ikke at være skadelige, hvis du sluger små mængder. Hvis du ved et uheld får Sebiprox shampoo i munden, skal du straks skylle med vand. Hvis du ved et uheld kommer til at sluge en stor mængde Sebiprox shampoo, skal du kontakte lægen eller apoteket.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme ved hyppigheder, som er defineret som følger:

- meget almindelige: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer
- almindelige: kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer
- andre, hvor hyppigheden ikke er kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data.

Følgende bivirkninger er set ved Sebiprox shampoo:

Meget almindelige:

- hudirritation*
- kløe*.

Almindelige:

- udslæt*
- brændende fornemmelse på huden
- rødme på huden, hvor shampooen er påført*.

Andre, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- allergisk reaktion
- afskalning af huden*
- eksem (kløende udslæt)*
- hårtab*
- ændringer i hårfarve.

Nogle bivirkninger (markeret med *) kan også være symptomer på den sygdom du behandler. Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger for første gang, når du bruger Sebiprox shampoo eller hvis du oplever, at hudirritation, rødme eller kløe bliver værre, skal du stoppe med at bruge shampooen og kontakte lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Sebiprox ved almindelig temperatur.

Brug ikke Sebiprox efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Sebiprox 1,5 % shampoo indeholder:

- Aktivt indholdsstof: ciclopiroxolamin, svarende til 1,50 g ciclopiroxolamin i 100 g shampoo.
- Øvrige indholdsstoffer: Natriumlaurylethersulfat 70 %, cocamidopropylbetain, dinatriumphosphatdodecahydrat, citronsyremonohydrat, coconut diethanolamin, hexylenglycol, oleylalkohol, polysorbat 80, polyquanternium-10, parfume AF17050 (indeholder dipropylenglycol), natriumhydroxid, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Sebiprox shampoo er klar lysegul til lys orange og fås i pakningsstørrelserne 60 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 250 ml, 350 ml eller 500 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park
Sligo
Irland

Repræsentant i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S
Nykær 68
2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Famar Nederland B.V., Ad Bladel, Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Cypern: Stieprox 1.5% Σαμπρούαν
Danmark: Sebiprox
Estland: Sebiprox, 1.5% šampoon
Finland: Stieprox 1.5% Shampoo
Frankrig: Sebiprox 1.5% Shampooing
Grækenland: Stieprox Shampoo 1.5%
Italien: Sebiprox 1,5% Shampoo
Letland: Stieprox 1.5% Shampoo
Litauen: Stieprox 1.5% šampūnas
Malta: Sebiprox 1.5% Shampoo
Norge: Sebiprox 1,5% Sjampo
Portugal: Sebiprox
Slovakiet: Stieprox 1.5% Shampoo
Spanien: Sebiprox 1,5% champú
Sverige: Sebiprox 1,5% schampo
Tjekkiet: Stieprox
Tyskland: Sebiprox 1,5% Loesung

Østrig: Stieprox 1,5% Shampoo

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2012.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.indlaegsseddel.dk/>.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk

Stiefel logo