

Wellbutrin® 150 mg filmovertrukne depottabletter

bupropionhydrochlorid

0236785904

Wellbutrin® svarer til lægemidlet Zyban®

Wellbutrin® er et registreret varemærke, som tilhører GlaxoSmithKline Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Wellbutrin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Wellbutrin® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Wellbutrin®'s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Wellbutrin®
3. Sådan skal De bruge Wellbutrin®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Wellbutrin®
6. Yderligere oplysninger

1. Wellbutrin®'s virkning og hvad De skal bruge det til

Wellbutrin® er, sammen med rådgivning, et hjælpemiddel til at holde op med at ryge. Wellbutrin® virker ved at nedsætte behovet og lysten til at ryge, antagelig via en påvirkning af kemiske stoffer i hjernen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Wellbutrin® Brug ikke Wellbutrin® hvis De:

- er overfølsom overfor bupropion eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Wellbutrin®.
- har eller har haft tilfælde af krampeanfald.
- har eller har haft en svulst i hjernen.
- pludselig holder op med at drikke alkohol eller stopper med at tage beroligende medicin fx benzodiazepiner.
- har eller har haft spiseforstyrrelser.
- har alvorlig leversygdom.
- har eller har haft mani/depressiv sygdom.
- bruger medicin mod depression fx MAO-hæmmere. Der skal gå mindst 24 timer mellem ophør med visse antidepressive midler (reversible MAO-hæmmere) og start på Wellbutrin®, og mindst 2 uger mellem ophør med andre antidepressive midler (irreversible MAO-hæmmere) og start på Wellbutrin®. Tal med lægen om det.

- får anden medicin, der indeholder bupropion, da det øger risikoen for krampetilfælde.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Wellbutrin®

De må ikke tage mere Wellbutrin® end lægen har angivet.

Det er vigtigt, at De inden behandlingen starter, har fortalt lægen, hvilken medicin De anvender:

- mod depression
- mod psykoser
- malariamidler
- mod smerter (tramadol)
- mod astma (theofyllin)
- binyrebarkhormon
- mod infektioner (quinoloner)
- mod allergi og transportsyge (sløvende)

Det er ligeledes vigtigt at lægen ved:

- hvor meget alkohol De drikker
- om De har haft hjernerystelse eller lignende
- om De har sukkersyge og hvilken medicin De får for det
- om De bruger medicin, der hæmmer eller stimulerer appetitten
- hvis De har nyre- eller leverproblemer

Hvis De får kramper, når De bruger Wellbutrin®, skal De stoppe behandlingen og De må ikke bruge Wellbutrin® igen. Tal med lægen.

Rygeophør kan give en nedtrykt sindstilstand. Der er set sjældne tilfælde af depression, der også omfatter selvmordstanker hos personer, der forsøger at holde op med at ryge. Disse symptomer er også set under behandling med Wellbutrin® og er ofte opstået tidligt i behandlingsforløbet. Tal med Deres læge, hvis De oplever disse symptomer.

Hvis De får allergiske symptomer såsom hududslæt, nældefeber, kløe, brystsmerter, hævelse i ansigt eller mundhule, åndenød, led- og muskelsmerter i forbindelse med feber og udslæt, skal De straks kontakte Deres læge, da De muligvis skal stoppe behandlingen.

Inden behandlingen starter, skal De have målt Deres blodtryk.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er især vigtigt, at De fortæller lægen, hvis De bruger følgende medicin:

- mod depression (citalopram, MAO-hæmmere, desipramin, imipramin, paroxetin, clomipramin, fluvoxamin)
- mod psykisk sygdom (risperidon, thioridazin, clozapin)
- mod forhøjet blodtryk (metoprolol)
- forebyggende mod blodpropper (clopidogrel, ticlopidin)
- mod HIV-virus (ritonavir)
- for hjertet (propafenon, flecainid)
- mod kræft (cyclophosphamid, ifosfamid)
- mod Parkinsons sygdom (orphenadrin, levodopa, amantadin)
- mod epilepsi og ansigtssmerter (carbamazepin, olanzapin, phenytoin, valproat)
- mod astma (theofyllin)
- mod stærke smerter (pentazocin)

De bør nedsætte eller helt undgå indtagelse af alkohol under behandlingen.

Hvis De tager Wellbutrin® i forbindelse med et fedtholdigt måltid, er der risiko for at koncentrationen af bupropion i blodet stiger.

Brug af Wellbutrin® sammen med mad og drikke

De kan tage Wellbutrin® sammen med mad og drikke.

Hvis De tager Wellbutrin® i forbindelse med et fedtholdigt måltid, er der risiko for at koncentrationen af bupropion i blodet stiger.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Sikkerheden ved brug af Wellbutrin® under graviditet er ikke fastslået. De bør derfor ikke anvende Wellbutrin®, hvis De er gravid.

Amning

Wellbutrin® bliver udskilt i modermælken. Hvis De bruger Wellbutrin®, bør De ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Wellbutrin® kan virke sløvende i større eller mindre grad. Brug af Wellbutrin® kan gøre Dem svimmel og omtåget. Det skal De tage hensyn til, hvis De skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

3. Sådan skal De bruge Wellbutrin® Dosering

De skal starte behandlingen med Wellbutrin®, mens De stadig ryger. Fastsæt

en rygestopdato med lægen indenfor de første 2 uger af behandlingen, helst i den anden uge.

Voksne: 1 filmoverttrukken depottablet (150 mg) daglig i 6 dage. På 7. dag sættes dosis op til 1 filmoverttrukken depottablet (150 mg) 2 gange daglig. Der skal være mindst 8 timer mellem doserne. For at undgå søvnløshed skal De ikke tage Wellbutrin® ved sengetid.

Wellbutrin® filmoverttrukne depottabletter skal synkes hele, må ikke knuses, tygges eller deles.

Behandlingens varighed er 7-9 uger. Behandlingen bør stoppes, hvis den ikke har virket efter 7 uger. Tal med lægen om behandlingen evt. skal trappes ned.

Ældre: Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: De må ikke anvende Wellbutrin® til børn og unge under 18 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Dosis skal nedsættes. Lægens anvisning skal følges.

Brug altid Wellbutrin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis De har taget for mange Wellbutrin® filmoverttrukne depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Wellbutrin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er døsighed, bevidstløshed, hjerterytmeforstyrrelser, uregelmæssig eller hurtig puls.

Hvis De har glemt at tage Wellbutrin®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at tage Wellbutrin®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Wellbutrin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Depression, angst. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): For højt blodtryk. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Allergiske reaktioner med hævelse i mund og svælg, åndenød og shock, hallucinationer, kramper, leverbetændelse, hudlidelse ledsaget af feber og ledproblemer i nogle tilfælde alvorlig, med blæreformet udslæt og betændelsesreaktioner, hudlidelse ledsaget af feber og ledproblemer, parkinsonisme. Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Vrangforestillinger, paranoide forestillinger, aggression. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Nældefeber, ophidselse, rysten, koncentrationsbesvær, hovedpine, svimmelhed, smagsforstyrrelser, mundtørhed, kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, hududslæt, kløe, svedtendens, feber.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Spiseforstyrrelser (madlede), forvirring, synsforstyrrelser, tinnitus, langsom hjerterytme, rødmen, bryst smerter, kraftsløshed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Led- og muskelsmerter i forbindelse med feber og hududslæt, forstyrrelser i blodsukkerniveauet, irritabilitet, fjendtlig adfærd, uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person, abnorme drømme, mareridt, ufrivillige bevægelser, manglende koordinering af bevægelser, hukommelsessvækkelse, føleforstyrrelser, besvimelse, hjertebanken, udvidelse af små blodkar, for lavt blodtryk når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, gulsot, forværring af psoriasis, hurtige små muskelsammentrækninger, ændringer i urinmængder og hyppighed, påvirkning af leverfunktion.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Rastløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Wellbutrin®

Wellbutrin® opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original emballage.

Brug ikke Wellbutrin®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Wellbutrin® 150 mg filmoverttrukne depottabletter indeholder:

- Aktivt stof:
Bupropionhydrochlorid 150 mg.
- Øvrige indholdsstoffer:
Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, cysteinhydrochloridmonohydrat, magnesiumstearat, macrogol 400, carnaubavoks, titandioxid (E 171) og sort jernoxid (E 172).

Wellbutrin®s udseende og pakningsstørrelse:

Wellbutrin® er hvide, filmoverttrukne, bikonvekse, runde depottabletter, der er mærket GX CH7 på den ene side.

Wellbutrin® findes i pakningsstørrelsen 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2008