

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Alfuzosin 2care4 10 mg depottabletter

Alfuzosinhydrochlorid

04-2014
P499230-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin 2care4
3. Sådan skal du tage Alfuzosin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alfuzosin 2care4 hører til en gruppe lægemidler, der kaldes alfa-adrenoreceptorantagonister eller alfablokkere.

Alfuzosin "2care4" kan bruges til at behandle moderate til svære symptomer på forstørret blærehalskirtel (prostata), også kaldet godartet prostatahypertrofi. Forstørrede blærehalskirtler kan give problemer i form af hyppig og besværet vandladning, især om natten. Alfablokkere får musklerne i prostata og blærehalsen til at slappe af. Det letter urinens udstømning af blæren.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin 2care4

Tag ikke Alfuzosin 2care4

- hvis du er allergisk over for alfuzosin, andre quinazoliner (f.eks. terazosin, doxazosin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alfuzosin 2care4 (angivet i punkt 6).
- hvis du lider af en sygdom, der kan give et markant blodtryksfald, når du rejser dig.
- hvis du har leverproblemer.
- hvis du er i behandling med andre lægemidler, der hører til gruppen af alfablokkere.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Alfuzosin 2care4, hvis du

- har svære nyreproblemer.
- tager andre lægemidler mod forhøjet blodtryk. I så fald vil lægen kontrollere dit blodtryk regelmæssigt, især i begyndelsen af behandlingen.
- mærker et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig, i form af svimmelhed, svækkelse eller svedudbrud i løbet af nogle få timer efter, at du har taget Alfuzosin 2care4. Hvis du mærker et fald i blodtrykket, skal du lægge dig ned med ben og fødder i vejret, indtil symptomerne er aftaget. Disse bivirkninger vil normalt indtræffe i begyndelsen af behandlingen og være kortvarige. Normalt vil det ikke være nødvendigt at standse behandlingen.
- tidligere har oplevet et markant blodtryksfald efter indtagelse af andre lægemidler i gruppen af alfablokkere. I så fald vil din læge indlede behandling med en lav dosis Alfuzosin 2care4, hvorefter dosis gradvist øges.

- lider af akut hjertesvigt.
- har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
- har hjertekrampe (angina pectoris) og får nitrat, da det kan øge risikoen for et blodtryksfald. Du bør rådføre dig med din læge, om du skal fortsætte behandlingen mod hjertekrampe eller holde op med at tage Alfuzosin 2care4, især når brystsmerten vender tilbage eller tager til.
- skal opereres for grå stær, bør du inden operationen informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med Alfuzosin 2care4. Alfuzosin 2care4 kan forøge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.

Brug af anden medicin sammen med Alfuzosin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

- ketoconazol, itraconazol, clarithromycin og erythromycin (lægemidler til behandling af bakterie- og svampeinfektioner).
- ritonavir (lægemidler mod HIV-infektion).
- lægemidler til sænkning af blodtrykket (andre alfa-blokkere).
- lægemidler (nitrater) mod symptomerne på hjertekrampe (angina pectoris). Vær opmærksom på, at samtidig brug af Alfuzosin 2care4 og lægemidler mod forhøjet blodtryk eller nitrater mod hjertesygdomme kan føre til for lavt blodtryk.
- lægemidler, som man får før en operation (generel anæstesi). De kan få blodtrykket til at falde markant. Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du får Alfuzosin 2care4.

Brug af Alfuzosin 2care4 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Alfuzosin 2care4 efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Alfuzosin 2care4 er kun til behandling af mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alfuzosin 2care4 kan især i begyndelsen af behandlingen gøre dig omtåget, svimmel eller afkræftet, det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Alfuzosin 2care4 indeholder lactose

Alfuzosin 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Alfuzosin 2care4

Tag altid Alfuzosin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Tabletteerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1 1/2 dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 depottablet (10 mg) en gang dagligt. Tag den første tablet ved sengetid. Tag tabletterne umiddelbart efter det samme måltid hver dag og synk dem hele med rigeligt væske. Du må ikke knuse, pulverisere, tygge eller dele tabletterne, da for meget af det aktive stof alfuzosin for hurtigt kan påvirke din krop. Det kan øge risikoen for uønskede bivirkninger.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Alfuzosin 2care4 10 mg depottabletter.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Alfuzosin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Alfuzosin 2care4 depottabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Ved symptomer på overdosering skal du kontakte din læge, da det kan være nødvendigt at indlægge dig for at behandle blodtryksfaldet.

Hvis du har glemt at tage Alfuzosin 2care4

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alfuzosin 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemuslen. Kontakt læge eller skadestue. (Tiltagende eller tilbagevendende angina pectoris).
- Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Træthed, svimmelhed (vertigo) og hovedpine.
- Markant blodtryksfald, når man rejser sig (især hvis behandlingen indledes med en for høj dosis, eller når behandlingen genoptages).
- Mavesmerter, kvalme, diarré.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Alfuzosin 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Kraftsløshed og svaghed.
- Utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Omtågethed.
- Synsforstyrrelser.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112. (især i begyndelsen af behandlingen).
- Hjerteranken.
- Snue.
- Opkastning.
- Udslæt (nældefeber, rødme), kløe.
- Vandladningsproblemer.
- Vand i kroppen. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
- Hedefure.
- Bryst smerter.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: ssst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Alfuzosin 2care4 utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Alfuzosin 2care4 ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Alfuzosin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den foregående måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alfuzosin 2care4 indeholder:

Aktivt stof: 10 mg alfuzosin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, povidon, talcum, magnesiumstearat, hypromellose, hydroxypropylcellulose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Alfuzosin 2care4 10 mg depottabletter er hvide, runde tabletter mærket "RY10" på den ene side.

Pakningsstørrelser

Alfuzosin 2care4 fås i pakningsstørrelser á 30 og 90 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Alfuzosin 2care4 svarer til Alfuzosin Ranbaxy.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2014