

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" 10 mg og 20 mg filmoverturkede tabletter

Lercanidipinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lercanidipinhydrochlorid 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4"
3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes calciumantagonister. De virker kraftigt karudvidende på arterier og vener og er dermed blodtryksnedsættende. Lercanidipinhydrochlorid "2care4" anvendes til at behandle forhøjet blodtryk. Lægen kan have givet dig Lercanidipinhydrochlorid "2care4" for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LERCANIDIPINHYDROCHLORID "2CARE4"

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid "2care4"

- hvis du er overfølsom over for lercanidipinhydrochlorid, dihydropyridiner eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har karforsnævninger ved hjertet.
- hvis du har ubehandlet hjertesvigt.
- hvis du har ustabile brystmerter (angina pectoris).
- hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion.
- hvis du samtidig tager CYP3A4 hæmmere som ketonazol, itraconazol, ritonavir, erytromycin, troleandomycin.
- hvis du samtidig tager ciclosporin.
- hvis du samtidig indtager grapefrugtjuice, da det øger virkningen af Lercanidipinhydrochlorid "2care4".
- hvis du er gravid eller ammer.
- hvis du inden for den sidste måned har haft en blodprop.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Lercanidipinhydrochlorid "2care4". Tal med lægen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4"

Tal med lægen hvis du:

- har andre hjerteproblemer, eller hvis du har pacemaker eller allerede har angina pectoris.
- har problemer med leveren eller nyrerne hvis du fx er i dialyse.

Vær opmærksom på at alkohol bør undgås, da det kan forstærke virkningen af Lercanidipinhydrochlorid "2care4".

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

- mod svamp (ketonazol, itraconazol).
- mod HIV (ritonavir).
- som antibiotika (erythromycin, troleandomycin)
- mod forhøjet blodtryk (betablokkere (metoprolol)) eller ACE-hæmmere (enalapril, ramipril, lisinopril).
- diuretika (vanddrivende (furosemid)).
- mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand (cimetidin, i doser på mere end 800 mg)
- hjerteproblemer (digoxin)
- søvnbesvær (midazolam)
- mod tuberkulose (rifampicin)
- mod allergi (astemizol eller terfenadin)
- mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron eller quinidin)
- mod epilepsi (phenytoin eller carbamazepin). Du skal muligvis have målt dit blodtryk tiere end normalt hos lægen.

Brug af Lercanidipinhydrochlorid "2care4" sammen med mad og drikke

- Du skal tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4" mindst 15 minutter før et måltid.
- Du bør ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Lercanidipinhydrochlorid "2care4", da det kan forstærke virkningen.
- Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4". Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4" da det går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdsikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vær opmærksom på følgende symptomer: svimmelhed, træthed og i sjældne tilfælde kan man falde i søvn.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lercanidipinhydrochlorid "2care4"

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LERCANIDIPINHYDROCHLORID "2CARE4"

Tag altid Lercanidipinhydrochlorid "2care4" nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 filmoverturket tablet på 10 mg om dagen mindst 15 minutter før et måltid. Din læge kan måske anbefale dig at øge dosis til 1 filmoverturket tablet på 20 mg om dagen.

Tabletterne bør tages hele med lidt vand.

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Lercanidipinhydrochlorid "2care4" til alle de anførte doseringer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må kun bruge Lercanidipinhydrochlorid "2care4" til børn under 18 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Lercanidipinhydrochlorid "2care4" filmoverturkede tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lercanidipinhydrochlorid "2care4" tabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kardiogent chok (bleg hud, svag uregelmæssig puls, øget vejrtrækning, klamtsvedende, hjertebanken, sløret bevidsthed), myokardiel iskæmi (åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben), kvalme, opkastninger, let nyresvigt, forhøjet blodtryk, søvnighed.

Hvis du har glemt at tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4"

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Lercanidipinhydrochlorid "2care4"
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 1000 ud af 10.000 patienter.

- Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.
- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 100 ud af 1.000 patienter.

- Hævede fødder, ankler og hænder.
- Hovedpine, svimmelhed.
- Rødme.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertebanken.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 1000 ud af 10.000 patienter.

- Sure opstød / halsbrand.
- Diarree, mavesmerter, opkastning.
- Udslæt.
- Forøget urinmængde.
- Muskelsmerter.
- Træthed, kraftsløshed og svaghed.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end

1 og 10.000 patienter

- Forbigående forandringer i leverfunktionen.
- Opsvulmet tandkød.
- Overfølsomhed.
- Hyppig vandladning.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Bryst smerter

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Lercanidipinhydrochlorid "2care4" ved temperaturer over 25 °C.
Opbevar Lercanidipinhydrochlorid "2care4" i original emballage, da det er følsomt for fugt.

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid "2care4" efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" 10 mg og 20 mg

Filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof:

1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydrochlorid svarende til 9,4 mg lercanidipin.

1 filmovertrukken tablet indeholder 20 mg lercanidipinhydrochlorid svarende til 18,8 mg lercanidipin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon, natriumstivelsesglycolat Type A, lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose.

Filmovertræk: macrogol, polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), talcum, titanoxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172, findes kun i 20 mg filmovertrukne tabletter).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" 10 mg filmovertrukne tabletter er gule, runde, bikonvekse, 6,5 mm med delekærv på den ene side, og præget med "L" på den anden side.

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" 20 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, 8,5 mm med delekærv på den ene side, og præget med "L" på den anden side.

Pakningsstørrelser

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" fås i pakningsstørrelser á 30 stk og 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Lercanidipinhydrochlorid "2care4" svarer til Zanidip.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2010