

Almogran® 12,5 mg – Filmovertrukne tabletter

Almotriptan

L90172A-01

- Almogran® er et registreret varemærke, der tilhører Laboratorios Almirall, S.A.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Almogran til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedlen kan også hentes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Almogran
- Sådan skal du tage Almogran
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Almogran er et middel mod migræne. Almogran anvendes til at lette hovedpine i forbindelse med migræneanfald, med eller uden aura.

Almogran bør kun anvendes ved et aktuelt migræneanfald og ikke forebyggende for at hindre migræneanfald.

Lægen kan have givet dig Almogran for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Almogran

Tag ikke Almogran

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for almotriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du har eller tidligere har haft en hjertesygdom, et hjertetilfælde, angina pectoris, Prinzmetal's angina
- hvis du har stærkt forhøjet blodtryk
- hvis du har svær leversygdom
- hvis du har haft et slagtilfælde eller har haft nedsat blodtilførsel til hjernen
- hvis du har haft sygdomme i de yderliggende blodkar i kroppen
- hvis du tager lægemidler mod migræne inklusive andre 1B/1D agonister og præparater, der indeholder ergotamin, dihydroergotamin og methysergid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Almogran

Tal med lægen, inden du tager Almogran, hvis du:

- endnu ikke har fået diagnosticeret din hovedpine som migræne, eller hvis dit anfald af migræne er anderledes, end det plejer
- er i risikogruppen for at udvikle hjertesygdomme (dvs. hvis du har forhøjet blodtryk,

forhøjet kolesterol, er overvægtig, har diabetes, er ryger eller er arveligt disponeret for hjertesygdomme)

- er en kvinde efter klimakteriet eller er en mand over 40 år, bør du undlade at tage Almogran, før det er påvist, at du ikke lider af en hjertesygdom
- er allergisk overfor sulfonamider (antibiotika som anvendes ved infektion i urinvejene)
- har brystsmerte, sammensnøring af luftveje eller brystkasse eller har andre symptomer, som typisk optræder i forbindelse med hjertetilfælde. Hvis du har mærket de førnævnte symptomer undlad da at tage flere doser af Almogran, før du har konsulteret din læge
- lider af en nyre- eller leversygdom
- tager Almogran før eller efter, at du har taget anden medicin for migræne, som indeholder ergotamin eller ergotamin-lignende stoffer
- fornemmer at dit blodtryk stiger.

Langvarig brug af enhver smertestillende medicin mod hovedpine kan gøre hovedpinen værre. Hvis denne situation opleves eller mistænkes, bør lægen kontaktes.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Almogran, og / eller Almogran kan påvirke anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Almogran sammen med mad og drikke

Du skal tage Almogran filmovertrukne tabletter med et glas vand. De filmovertrukne tabletter kan indtages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Almogran efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Almogran efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Almogran kan give bivirkninger (døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Almogran

Almogran indeholder mannitol, som i en mængde over 10 g kan have en mild afførende virkning.

3. Sådan skal du tage Almogran

Dosering

Almogran filmovertrukne tabletter skal indtages sammen med væske så hurtigt som muligt, når migrænen starter.

Tag altid Almogran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne (18-65 år)

Startdosis er 1 tablet, som indtages efter migrænen indtræden. Kommer migrænen tilbage inden for 24 timer, kan der tages endnu 1 tablet. Der bør gå mindst 2 timer mellem de to doser.

Du bør ikke tage en ekstra tablet for det samme migræneanfald, selvom den første tablet ikke har tilstrækkelig effekt.

Der må højst indtages 2 tabletter inden for 24 timer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Du må kun bruge Almogran til børn efter aftale med en læge.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Almogran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Almogran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering:
Søvnliggende bevidsthedssvækkelse.

Hvis du har glemt at tage Almogran

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Almogran

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Almogran er stoppet.

4. Bivirkninger

Almogran kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Aflukning af luftveje med åndedrætsbesvær til følge. Ring 112

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Bryst smerter med udstråling til hals eller arme samt åndenød og angst. Ring 112

Ikke kendt (Kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

- Hjerteanfald. Ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed
- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
- Hovedpine
- Kvalme, opkastning
- Træthed

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Tinnitus
- Hjertebanken
- Diarre, sure opstød / halsbrand
- Mundtørhed
- Muskelsmerter, knoglesmerter
- Kraftsløshed og svaghed

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Krampagtig sammentrækning af et blodkar
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring 112

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn
- Du kan opbevare Almogran ved almindelig temperatur
- Tag ikke Almogran efter den udløbsdato, der står på pakningen

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Almogran, 12,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Almogran 12,5 mg som almotriptan D,L-hydrogenmalat 17,5 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrySTALLINSK cellulose, povidon, natriumstivelsesglycolat, natriumstearylfumarat, hypromellose, titandioxid (E 171), makrogol 400, carnaubavoks, propylenglycol, indigocarmin (E 132).

Pakningsstørrelser

Almogran® 12,5 mg fås i pakninger med hhv. 6 og 9 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149, DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 08.2011