

**Information om Proctosedyl
suppositorier
hydrocortison 5 mg/g, cinchocainhydrochlorid 5 mg/g, framycetinsulfat 10
mg/g, aesculin 10 mg/g**

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Proctosedyl til dig personligt. Lad derfor være med at give Proctosedyl til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Proctosedyls virkning og hvad du skal anvende det til
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Proctosedyl
3. Sådan skal du anvende Proctosedyl
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Proctosedyl
6. Yderligere oplysninger

1. PROCTOSEDYLS VIRKNING OG HVAD DU SKAL ANVENDE DET TIL

Proctosedyl modvirker kløe og irritation på grund af hæmorider ved endetarmsåbningen. Proctosedyl virker lokalbedøvende og dæmper betændelse. Proctosedyl får udvidede blodkar til at trække sig sammen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE PROCTOSEDYL

Anvend ikke Proctosedyl hvis:

- Du har betændelse ved endetarmsåbningen.
- Du er overfølsom over for aminoglykosider, specielt neomycin (mod betændelse).
- Du er overfølsom over for hydrocortison, cinchocainhydrochlorid, framycetinsulfat, aesculin eller et eller flere af de øvrige hjælpestoffer i Proctosedyl.

Vær ekstra forsigtig med at anvende Proctosedyl

Hvis du anvender Proctosedyl regelmæssigt gennem længere tid, kan indholdsstofferne blive optaget i kroppen.

Doping:

Flere af indholdsstofferne står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer.

Anvendelse af anden medicin

Du kan anvende Proctosedyl samtidig med andre lægemidler.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du anvender nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun anvende Proctosedyl efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan amme, selvom du anvender Proctosedyl, men tal først med din læge, da et af indholdsstofferne i Proctosedyl (hydrocortison) bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du anvende Proctosedyl

Dosering

Voksne: Du skal anvende Proctosedyl 2-3 gange daglig samt efter afføring.

Børn: Du må kun anvende Proctosedyl til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Brugsanvisning:

Vask hænderne og tag stikpillen ud af plastlommen. Før stikpillen ca. 3 cm ind i endetarmsåbningen. Forbliv i ro i et par minutter og vask herefter hænder.

Du kan anvende Proctosedyl stikpiller alene eller sammen med Proctosedyl rektalsalve.

Har du anvendt for meget Proctosedyl?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere af Proctosedyl end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering: Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser, eksitation i form af rystelser, forvirring, kramper, koma, nedsat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop.

Har du glemt at anvende Proctosedyl?

Har du glemt at anvende Proctosedyl, fortsætter du blot med at anvende næste dosis som ordineret.

4. Bivirkninger

Proctosedyl kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
Tynd slimhinde i endetarmen, som giver en brændende fornemmelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).
Eksem, tynd hud, allergiske reaktioner.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Anvend ikke Proctosedyl suppositorier efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
Opbevar Proctosedyl suppositorier ved 2° C – 8° C.
Opbevar Proctosedyl suppositorier utilgængeligt for børn.

6. Yderligere information

Proctosedyl Suppositorier er uniforme, glatte, off-white suppositorier.

Proctosedyl Suppositorier indeholder:

De aktive indholdsstoffer i Proctosedyl suppositorier er: hydrocortison; cinchocainhydrochlorid; framycetinsulfat og aesculin.

Det øvrige indholdsstof er: suppocire AM (fedtstof).

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Markedsføring i Danmark:

Aventis Pharma A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Fremstiller:

Patheon UK Limited, Swindon, England eller Aventis, Compiègne, Frankrig.

Revideret: Januar 2007