

Dalacin® C 300 mg, hårde kapsler

clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dalacin® C til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin® C
3. Sådan skal du tage Dalacin® C
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dalacin® C kapsler indeholder et antibiotikum. Du kan bruge Dalacin® C til behandling af betændelse (infektion), der skyldes bakterier.

Lægen kan have givet dig Dalacin® C for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DALACIN® C

Tag ikke Dalacin® C

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dalacin® C

Fortæl lægen, hvis du

- tidligere har haft en tarmsygdom.
- har lever- eller nyreproblemer.

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Dalacin® C.

Kontakt straks lægen, hvis du får voldsomt eller langvarig, blodig diarré, når du bruger eller har brugt Dalacin® C. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Ved behandling i længere tid vil lægen tage blodprøver for at kontrollere, om din lever og dine nyrer fungerer normalt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis du samtidig tager

- muskelafslappende stoffer.
- anden medicin mod betændelse (erythromycin).

Brug af Dalacin® C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin C med mindst et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dalacin® C. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dalacin® C, da Dalacin® C går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin® C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin® C

Dalacin® C indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DALACIN® C

Tag altid Dalacin® C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dalacin® C fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine kapsler til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

2-6 kapsler daglig (600-1800 mg) fordelt på 2-4 doser.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn over 1 måned

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 300-900 mg daglig fordelt på 3-4 doser. Følg lægens anvisning.

Børn under 1 måned

Børn under 1 måned må kun få Dalacin® C efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dalacin® C kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du har glemt at tage Dalacin® C

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Dalacin® C

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin® C, da sygdommen ellers kan blusse op igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dalacin® C kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalling og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt udslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter, opkastning, diarré, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Muskelsvaghed.
- Nældefeber, kløe, udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forbigående forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
- Udslæt med blæredannelse, røde pletter eller knuder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Smagsforstyrrelser.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
- Sår i spiserøret, sure opstød.

- Betændelse i skeden.
- Forhøjede levertal.

Dalacin® C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes direkte til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Dalacin® C ved temperaturer over 25° C.

Tag ikke Dalacin® C efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNING

Dalacin® C 300 mg, hårde kapsler indeholder

- Aktivt stof: Clindamycin 300 mg som clindamycinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vegetabilisk magnesiumstearat, majsstivelse, talcum, titandioxid (E171), indigotin I (E132), erythrosin (E127), gelatinekapsel.
- Sort trykkeblæk: Sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Dalacin® C 300 mg er en hvid hård gelatinekapsel mærket "CLIN 300" og "Pfizer".

Dalacin® C fås i pakninger med 16, 20 eller 24 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Dalacin® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC.