

Ciprallex® 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram	L80009A-07
--------------	------------

Ciprallex® er et registreret varemærke, der tilhører H. Lundbeck A/S

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciprallex
- Sådan skal du bruge Ciprallex
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Ciprallex er et middel mod depression. Det tilhører en gruppe af medicin, som kaldes SSRI. Ciprallex øger mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Forstyrrelser i hjernens serotoninssystem er en vigtig faktor ved depression og beslægtede sygdomme.

Du kan få Ciprallex til behandling af:

- depression
- panikangst
- socialangst (også kaldet socialfobi)
- generaliseret angst
- tvangstanker og tvangshandlinger

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CIPRALEX

Tag ikke Ciprallex

- hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram (angivet i pkt. 6).
- Hvis du tager anden medicin, som tilhører gruppen af medicin kaldet MAO-hæmmere som f.eks. selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom) og moclobemid (bruges til behandling af depression)
- hvis du tager Linezolid (antibioticum), som er et middel imod infektioner
- hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer)
- hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se også afsnittet ”Brug af anden medicin” nedenfor)

Advarsler og forsigtighedsregler

- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ciprallex
- hvis du har epilepsi. Behandling med Ciprallex bør stoppes, hvis du får anfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også under 4 ”Bivirkninger”).
 - hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen være nødt til at justere dosis.
 - hvis du har diabetes. Behandling med Ciprallex kan ændre blodsukkertallet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af insulin og/eller andre midler mod diabetes.
 - hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.
 - hvis du let kommer til at bløde eller få blå mærker.
 - hvis du får elektrokonvulsiv behandling.
 - hvis du har koronar hjertesygdom.
 - hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
 - hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 - hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerтеbanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

OBS!

Nogle patienter med mani depressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette. Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer.

Selv mordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du få selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du begynder at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke. Det kan ofte tage omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
- hvis du er ung. Undersøgelser har vist, at der er større risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at fortælle en ven eller pårørende, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Børn og unge under 18 år

Ciprallex bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Ciprallex til patienter under 18 år, fordi han/hun mener, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Ciprallex, og du ønsker at diskutere dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Ciprallex. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Ciprallex hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ciprallex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

- non-selektive monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranlycypromin som det aktive indholdsstof. Hvis du har taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Ciprallex. Efter ophør med Ciprallex skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler
- reversible selektive MAO-A-hæmmere (RIMA), der indeholder moclobemid (til behandling af depression)
- irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (til behandling af Parkinsons sygdom). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger
- antibiotikummet linezolid
- Lithium (til behandling af mani depressive lidelser) og tryptophan
- imipramin og desipramin (til behandling af depression)
- sumatriptan og lignende medicin (til behandling af migræne) og tramadol (mod svære smerter). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger
- cimetidin og omeprazol (til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for apopleksi). Disse midler kan øge mængden af Ciprallex i blodet
- prikbladet perikon (**Hypericum perforatum**) – et naturlægemiddel mod depression.
- acetylsalicylsyre og nonsteroid e antiinflammatoriske midler (medicin til at lindre smerter eller fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Disse lægemidler kan øge tendensen til blødning
- warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Lægen vil sikkert undersøge blodets koagulationstid ved indledning og afslutning af behandling med Ciprallex for at sikre, at du stadig får en passende dosis af det blodfortyndende middel
- mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (til behandling af depression) og tramadol (til behandling af svære smerter) på grund af en øget risiko for sænkning af krampetærsklen
- typiske antipsykotika (medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser) på grund af en øget risiko for sænkning af krampetærsklen samt midler mod depression

- flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte-karsygdomme), clomipramin og nortriptylin (mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan være nødvendigt at justere dosis af Ciprallex

TAG IKKE Ciprallex hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacín, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Brug af Ciprallex sammen med mad, drikke og alkohol

Ciprallex kan tages alene eller i forbindelse med et måltid (se under 3 ”Sådan skal du tage Ciprallex”). I lighed med en række lægemidler bør Ciprallex ikke kombineres med alkohol, selv om Ciprallex ikke forventes at interagere med alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Ciprallex.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ciprallex efter aftale med lægen. Hvis du tager Ciprallex under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: Åndedrætsbesvær, blålig hud, anfald, temperatursvingninger, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, apati, vedvarende gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Ciprallex. Når medicin som Ciprallex tages under gravidite-ten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og har vejtrækningsbesvær. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. Hvis du tager Ciprallex, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.

Amning

Tag ikke Ciprallex, hvis du ammer, medmindre du har talt med lægen om de fordele og ulemper, dette indebærer.

Ciprallex forventes at blive udskilt i modermælken.

Fertilitet

Citalopram (et lægemiddel lig Escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Ciprallex påvirker dig.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CIPRALEX

Tag altid Ciprallex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Depression

Den sædvanlige dosis er 10 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis er 5 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 10 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 20 mg dagligt.

Socialfobi

Den sædvanlige dosis er 10 mg dagligt. Din læge kan efter 2-4 uger vælge at nedsætte dosis til 5 mg eller øge dosis til højst 20 mg. Der går som regel 2-4 uger før virkning indtræffer, og behandlingen varer normalt 12 uger. Din læge kan vælge at forlænge behandlingen.

Generaliseret angst

Den sædvanlige startdosis er 10 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 20 mg dagligt.

Tvangstanker/tvangshandlinger (OCD)

Startdosis er 10 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 20 mg dagligt.

Ældre (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Ciprallex, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg dagligt.

Børn og unge (under 18 år)

Børn og unge under 18 år må kun få Ciprallex efter lægens anvisning.

Dosering

Du skal tage Ciprallex tabletter 1 gang dagligt med et glas vand. Du kan tage Ciprallex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. Tag altid Ciprallex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Ciprallex, selv om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand. Du må ikke ændre doseringen af Ciprallex uden først at have talt med lægen. Bliv ved med at tage Ciprallex i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen.

Hvis du har taget for mange Ciprallex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ciprallex tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er svimmelhed, rysten, rastløs uro, for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerteryt-men med hurtig eller uregelmæssig puls, opkastning, kvalme, forstyrrelser i salt- og væskebalance. I sjældne tilfælde feber, muskeltrækninger, forvirring, bevidstløshed, kramper, diarré, koma og serotonin syndrom med symptomerne ophidselse, forvirring, muskelrykninger, forstærkede reflekser, problemer med at styre arme og ben, rystelser, feber, øget sved og diarré.

Hvis du har glemt at tage Ciprallex

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med din sædvanlige dosis. Tal med lægen, hvis du har glemt at tage flere doser i træk.

Hvis du holder op med at tage Ciprallex

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. Når du holder op med at tage Ciprallex, og især hvis det sker brat, kan du få ophørssymptomer. Det er almindeligt ved ophør med behandling med Ciprallex. Risikoen er større efter langtidsbrug af Ciprallex eller ved store doser eller for hurtig nedtrapning af dosis. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger.

Hos nogle patienter kan de dog være generende eller langvarige (2-3 måneder eller længere).

Kontakt lægen, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Ciprallex. Ophørs-symptomer omfatter: Svimmelhed, føleforstyrrelser inklusive prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden og følelse af at få elektrisk stød, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, søvn-løshed), rastløs uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diarré, hjerтеbanken, følelsesmæssig uligevægtighed, irritabilitet og synsforstyrrelser. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ciprallex. Hvis du skal stoppe behan-dlingen med Ciprallex, skal dosis nedsættes gradvist over mindst 1-2 uger. Følg lægens anvisninger. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Ciprallex er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Ciprallex kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger forekommer hyppigst i løbet af de første par uger af behandlingen og aftager normalt i styrke og hyppighed ved fortsat behandling.

Kontakt lægen, hvis du får nogle af følgende bivirkninger under behandlingen

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Ophidselse, rysten, muskelkramper, feber, koma (serotonergt syndrom). Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis du får følgende bivirkninger:

- vandladningsbesvær
- kramper (anfald)
- hvis huden og det hvide i øjnene bliver gult, kan det være tegn på nedsat leverfunktion/hepatitis
- hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes

Endvidere er følgende bivirkninger indberettet

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Kvalme

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Nedsat appetit, øget appetit, vægtøgning.
- Forstoppelse, opkastning, diarré.
- Angst, uro, unormale drømme.
- Nedsat sexlyst, manglende orgasme hos kvinder, manglende sædafgang, impotens.
- Træthed, søvnløshed.
- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse.
- Rysten.
- Svimmelhed.
- Bihulebetændelse.
- Gaben.
- Feber.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Du bør derfor børste tænder oftere end normalt, mens du tager Cipralex. Tal evt. med din tandlæge.
- Øget svedtendens.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Ledsmerter, muskelsmerter (artralgi og myalgi).

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nældefeber (urticaria), udslæt, kløe (pruritus)
- Tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikanfald, forvirring
- Søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)
- Forstørrede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, susen for ørerne (tinnitus)
- Hårtab
- Vaginalblødning
- Vægttab
- Hurtig hjertebanken
- Hævelser i arme eller ben
- Næseblod

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Aggressivitet, depersonalisering, hallucinationer
- Langsom hjerterytm

Nogle patienter har indberettet (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data):

- Selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv (se også under 'Vær ekstra forsigtig med at tage Cipralex')
- Nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og ubehag med muskelsvækkelse eller forvirring)
- Svimmelhed når man rejser sig på grund af lavt blodtryk (ortostatisk blodtryk)
- Unormal leverfunktionstest (forhøjede leverenzym
- Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)
- Smertefuld erektion (priapisme)
- Blødningsforstyrrelser inklusive blødninger i hud og slimhinder (ekkymose) og nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
- Pludselige hævelser i hud og slimhinder (angioneurotiske ødemer)
- Stigning i mængden af urin, der udskilles (uhensigtsmæssig produktion af antidiuretikahormon)
- Mælkeflåd hos kvinder, der ikke ammer
- Mani
- En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin
- Ændring af hjerterytm
- Ændring af hjerterytm (kaldet 'forlænget QT-interval', som kan ses på et elektrokardiogram (EKG) – hjertets elektriske aktivitet)

Endvidere er der kendskab til en række bivirkninger af lægemidler, der virker på tilsvarende måde som escitalopram (det aktive indholdsstof i Cipralex). Det drejer sig om:

- Motorisk uro (akatisi)
- Anoreksi

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Cipralex utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Cipralex ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Cipralex efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cipralex indeholder:

Aktivt stof: Escitalopram som escitalopramoxalat. Hver Cipralex tablet indeholder 15 eller 20 mg escitalopram.
Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid vandfri silica, talcum, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E 171).

Pakningsstørrelser

Cipralex findes i pakningsstørrelserne 28 stk., 56 stk., 98 stk. og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:	Sipralexa
Bulgarien:	Cipralex
Cypern:	Cipralex
Danmark:	Cipralex
Den Tjekkiske Republik:	Cipralex
Estland:	Cipralex
Finland:	Cipralex
Frankrig:	Seroplex
Grækenland:	Cipralex
Irland:	Lexapro
Island:	Cipralex
Italien:	Cipralex
Letland:	Cipralex
Litauen:	Cipralex
Luxembourg:	Sipralexa
Malta:	Cipralex
Norge:	Cipralex
Polen:	Cipralex
Portugal:	Cipralex
Rumænien:	Cipralex
Slovakiet:	Cipralex
Slovenien:	Cipralex
Spanien:	Cipralex
Storbritannien:	Cipralex
Sverige:	Cipralex
Tyskland:	Cipralex
Ungarn:	Cipralex
Østrig:	Cipralex

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07.2013