

Creon® 40.000 hårde enterokapsler

Pankreatin

L90311A-02

Creon® er et registreret varemærke, der tilhører Abbott Products GmbH.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Creon
3. Sådan skal du bruge Creon
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Creon indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.
- Lægen kan have givet dig Creon 40.000 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CREON**Brug ikke Creon**

- hvis du er allergisk over for pancreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævninger i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pancreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanligt mange eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Creon

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Brug af Creon sammen med mad og drikke

- Du skal tage Creon sammen med rigelig væske i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Creon.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Creon efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan tage Creon, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

- Creon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CREON

Brug altid Creon nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Du bør desuden indtage rigelig væske (2-3 liter) hver dag i de perioder, hvor du bruger Creon. Du kan synke kapslerne hele, eller du kan åbne dem og bruge granulatet som drys på f.eks. ymer eller opslemmet i væske, f.eks. juice. Granulatet skal indtages straks derefter. Du må ikke tygge eller knuse granulatet.

Dosering**Den sædvanlige dosis er****Voksne:**

1 enterokapsel til de 3 hovedmåltider. Behandlingen starter med lav dosis og bliver derefter justeret til dit behov. Du må kun ændre din dosis i samråd med lægen.

Brug til børn:

Du må kun bruge Creon til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Hvis din læge har ordineret Creon til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Creon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Dette gælder især børn.

Hvis du har glemt at tage Creon

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Creon

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Creon kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

Stop behandlingen med Creon 40.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævring i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Mavesmerter

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning, opustethed.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Creon ved temperaturer over 25 °C.

- Opbevar i original emballage for at beskytte mod fugt.
- Må højst anvendes 3 måneder efter åbning af emballagen.
- Tag ikke Creon efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Creon 40.000, hårde enterokapsler indeholder:

- Pankreatin svarende til
- amylase 25.000 EP-enheder
 - lipase 40.000 EP-enheder
 - protease 1.600 EP-enheder

Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000, hypromellosephthalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, jernoxid (E172), titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Pakningsstørrelser

100 enterokapsler

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2013