

Zinnat® 500 mg, filmovertrukne tabletter

cefuroxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Zinnat® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zinnat®
3. Sådan skal du tage Zinnat®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Zinnat® indeholder et antibiotikum cefuroxim, der tilhører gruppen cefalosporiner.

Zinnat® anvendes mod infektioner forårsaget af cefuroximfølsomme bakterier.

Lægen kan have givet dig Zinnat® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZINNAT®

Tag ikke Zinnat®

- hvis du er overfølsom over for cefuroxim, andre cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du tidligere har haft en anafylaktisk reaktion (voldsom allergisk reaktion) ved penicillinbehandling.

Vær ekstra forsigtig med at tage Zinnat®

Tal med lægen, inden du tager Zinnat®, hvis:

- du ikke kan tåle penicillin eller andre antibiotika.
- du har astma eller allergi.
- du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Kontakt lægen, hvis du får voldsom diarre under behandlingen med Zinnat®.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zinnat®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Det kan være nødvendigt at justere dosis.

Vanddrivende medicin, medicin mod for højt blodtryk og visse typer antibiotika, kan nedsætte nyrefunktionen.

Både chloramphenicol og tetracyklin ophæver virkningen af Zinnat®, og Zinnat® ophæver virkningen af chloramphenicol og tetracyklin.

Probenecid øger virkningen af Zinnat®.

Nogle midler mod for meget mavesyre kan nedsætte virkningen af Zinnat®.

Zinnat® kan nedsætte virkningen af P-piller og der bør suppleres med anden prævention.

Brug af Zinnat® sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Zinnat® kort tid efter et måltid og sammen med rigelig væske, helst vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Zinnat®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Zinnat®, da Zinnat® går over i modermælken. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Zinnat® er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Zinnat® kan give bivirkninger (svimmelhed, nervøsitet, rastløshed, forvirring), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zinnat®

Zinnat® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ZINNAT®

Tag altid Zinnat® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Zinnat® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

250 – 500 mg 2 gange daglig.

Børn

125 – 250 mg 2 gange daglig.

Zinnat® skal tages umiddelbart efter et måltid og sammen med rigelig væske, helst et stort glas vand.

Behandlingen varer som regel 5 – 10 dage.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Zinnat®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zinnat® tabletter, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Overdosering kan medføre krampes. Der er ikke set tilfælde med overdosering af Zinnat®.

Hvis du har glemt at tage Zinnat®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Zinnat®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zinnat®.

Spørg din læge eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Zinnat® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalling og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Diarré, kvalme, opkastning, mavesmerter.
- Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Svamp i mund og skede ved langvarig brug.
- Almen sløghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter.
- Nældefeber, kløe.
- Feber pga. overfølsomhed mod cefuroxim.

Zinnat®, 1. udgave

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Rastløshed, nervøsitet, forvirring, hallucinationer. Hallucinationer kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Zinnat® kan herudover give bivirkninger, som du ikke mærker noget til. Det drejer sig f.eks. om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zinnat® ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke Zinnat® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zinnat® 500 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Cefuroxim 500 mg (som cefuroximaxetil).
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, vegetabilsk olie, natriumlaurylsulfat, kolloid vandfri silica, propylenglycol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), hypromellose, titandioxid (E171), natriumbenzoat (E211).

Pakningsstørrelser

Zinnat® 500 mg findes i pakninger med 12, 14, 48 og 50 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Tarp Byvej 81-83
6715 Esbjerg N.

Zinnat® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited.