

Vepesid® 50 mg kapsler, bløde Etoposid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Vepesid® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepesid®
3. Sådan skal du tage Vepesid®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Vepesid® er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Behandling med Vepesid® kaldes kemoterapi.

Vepesid® hæmmer væksten af kræftceller.

Lægen kan have givet dig Vepesid® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VEPESID®

Tag ikke Vepesid®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for etoposid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis din knoglemarv fungerer dårligt.
- hvis du har meget dårligt lever.
- hvis du har nyresvigt.
- hvis du er gravid.
- hvis du skal vaccineres mod gul feber eller skal vaccineres med en anden levende vaccine.

Vær ekstra forsigtig med at tage Vepesid®

- Tal med lægen, inden du tager Vepesid®, hvis du
- har dårlige nyrer og lever.
- har en infektion.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får

- almindelig sløvhed, tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- vejrtrækningsproblemer, hurtig puls og rødme af huden, det kan være tegn på en alvorlig, allergisk reaktion.
- blødning fra hud og slimhinder og blå mærker. Dette kan være tegn på livstruende forandringer i blodet.

Vær opmærksom på følgende

- Vepesid® kan påvirke menstruationerne hos kvinder og nedsætte sædkvaliteten hos mænd samt evnen til at få børn. Hvis det er relevant, kan du tale med lægen om nedfrysning af sæd før behandlingen.
- Vepesid® kan have skadelige virkninger på æg- og sædceller. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6 måneder efter.
- Hvis du tidligere har fået behandling for din kræftsygdom kan det være nødvendigt, at holde pause inden du får Vepesid® kapsler.
- Hvis du får Vepesid® gennem længere tid, er der en risiko for, at du udvikler kræft pga. behandlingen.

- Ved behandling med etoposid i kombination med en anden kemoterapi, kan der forekomme en lidelse kaldet tumorlysesyndrom, hvor kroppen ikke er i stand til at udskille alle affaldsprodukterne fra de celler, som etoposid dræber. Det kan i sjældne tilfælde føre til abnorme niveauer af affaldsprodukter i blodet og muligvis nyresvigt. Hvis du bemærker smerter i siden eller har blod i urinen, skal du straks fortælle det til lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vepesid®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Så længe du får Vepesid®, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin til at hæmme immunforsvaret bl.a. efter organtransplantation (cyclosporin).
- anden medicin mod kræft (methotrexat, cisplatin).
- medicin mod epilepsi (phenytoin).
- blodfortyndende medicin (warfarin).
- medicin mod urinsyreigt og smerter (NSAID, fenybutazon, acetylsalicylsyre).

Samt:

- hvis du skal vaccineres.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Vepesid®, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under behandlingen og op til 6 måneder bagefter.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Vepesid® er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vepesid® kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Vepesid® kan give bivirkninger (træthed, døsigthed og forbigående blindhed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepesid®

Vepesid® indeholder natriummethylparahydroxybenzoat og natriumpropylparahydroxybenzoat som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VEPESID®

Tag altid Vepesid® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Kapslerne skal tages på tom mave og synkes hele. Din læge fastsætter dosis, så den passer til dig og din sygdom. Daglige doser over 200 mg bør gives som to daglige doser.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Vepesid® 50 mg kapsler, bløde.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis, afhængigt af i hvor stor grad din nyrefunktion er nedsat. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Vepesid® kapsler, bløde

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Vepesid® kapsler, bløde, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under afsnittet Bivirkninger, men i sværere grad f.eks. betændelse og sår på slimhinder, kvalme, opkastninger og mavesmerter. Forandringer i blodet som kan vise sig ved betændelser, blodmangel med træthed og bleghed, tendens til blødning. Alvorlig påvirkning af leveren med sløvhed, gulsot og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at tage Vepesid®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis skal du kontakte lægen.

Hvis du holder op med at tage Vepesid®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Vepesid® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Leukæmi, blodkræft. Kontakt lægen.
- Åndenød, angst, brystmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Kortåndethed / Vejtrækningsbesvær / Astmalig-nende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
- Ophævet evne til at bevæge sig, lammelser. Kontakt lægen.
- Høj feber, kulderystelser, almen sløvhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Lungebetændelse. Kontakt lægen.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Krampor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
- Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.
- Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Kvalme, opkastning.
- Hårtab.
- Appetitmangel/madlede.
- Hudpigmentering.
- Træthed.
- Utilpashed.
- Leverforgiftning.
- Forstoppelse, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Diarre.
- Mundbetændelse med hvide belægninger.
- Svimmelhed.
- Udslæt, kløe, nældefeber.
- Rødmen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Feber.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Kraftig sveden.
- Hævelse i ansigtet.
- Hævelse af tungen.
- Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Døsighed, svaghed.
- Smagsforstyrrelser.
- Forbigående blindhed.
- Øget indhold af urinsyre i blodet.
- Forvirring.
- Synkebesvær.
- Eksem eller irritation af huden / udslæt.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Eftersmag.
- Udebleven menstruation, udebleven ægløsning, nedsat frugtbarhed, menstruationer der kommer sjældent, for lange tidsintervaller (mere end 35 dage) mellem menstruationerne.
- Synsnervebetændelse.

Vepesid® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetnings-skema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Vepesid® ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Vepesid® i original emballage.

Tag ikke Vepesid® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vepesid® 50 mg kapsler, bløde indeholder:

Aktivt stof: Etoposid.

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; glycerol 85%; rensat vand; macrogol 400.

Kapslen indeholder: Gelatine; glycerol 85 %; natriummethylparahydroxybenzoat; natriumpropylparahydroxybenzoat; rød jernoxid (E172); titandioxid (E171); rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Lyserøde kapsler.

Pakningsstørrelse

Vepesid® fås i en pakningsstørrelse á 20 kapsler, bløde.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Vepesid® er et registreret varemærke, der tilhører Bristol-Myers Squibb Company.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013