

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CLARITYN®

10 mg tabletter

Loratadin

75773-01-01

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Clarityn® uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Clarityn®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn®.
3. Sådan skal du tage Clarityn®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Clarityn® er et antihistamin. Antihistaminer er medvirkende til at reducere allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.
- Clarityn® virker ved at lindre symptomerne som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne.
- Clarityn® kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lægen kan have givet dig Clarityn® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Clarityn®

Tag ikke Clarityn®

- hvis du er overfølsom over for loratadin, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn®

Tal med lægen, inden du tager Clarityn®, hvis du:

- har en leversygdom.

- skal have foretaget en hudprøvetest for allergi. Du må ikke tage Clarityn® i mindst 48 timer inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Clarityn®, og/ eller Clarityn® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Clarityn® sammen med mad og drikke

Du kan tage Clarityn® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:


Du må ikke tage Clarityn®, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Clarityn®, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarityn® kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.



Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn®

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Clarityn®.

3. Sådan skal du tage Clarityn®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet (10 mg) 1 gang dagligt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet vejer mere end 30 kg, vil dosis normalt være 1 tablet (10 mg), 1 gang dagligt. Følg lægens anvisning.

Børn (under 30 kg) må normalt ikke få Clarityn®, 10 mg, tabletter.

Du må kun bruge Clarityn® til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Nedsat leverfunktion:

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Clarityn® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Clarityn®

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Clarityn®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

- Søvnighed.
- Hurtige hjerteslag.
- Hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Clarityn®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Clarityn®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Clarityn® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger for børn mellem 2 og 12 år er:

- Hovedpine.
- Nervøsitet.
- Træthed.

For voksne og unge:

- Døsighed.
- Hovedpine.
- Øget appetit.
- Søvnløshed.

Alvorlige bivirkninger:

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Svimmelhed.
- Hjerterbanken
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Mavesmerter, kvalme, opkastning.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Clarityn® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Unormal leverfunktion.
- Hårtab.
- Udslæt.
- Træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Clarityn® utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Clarityn® ved almindelig temperatur.
- Tag ikke Clarityn® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Clarityn®, 10 mg, tabletter indeholder:

Loratadon 10 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, majsstivelse og magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser:

Clarityn® fås i:

Clarityn® 10 mg i pakninger med 10, 30 og 100 tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Clarityn® er et registreret varemærke, der tilhører Schering Corporation.