

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventolin® 0,2 mg/dosis, inhalationspulver, afdelt i Diskos®

Salbutamol

07-2017
P167282-4

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventolin
3. Sådan skal du tage Ventolin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventolin indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og herved ophæve den forsnævring af bronkierne, der optræder pludseligt i forbindelse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Ventolin virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængig af hvor svær din astma er. Du kan tage Ventolin inhalationspulver i Diskos til behandling eller forebyggelse af astmaanfald, der er udløst af allergi eller anstrengelse og andre former for vejrtrækningsbesvær.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ventolin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ventolin

- hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin (angivet i afsnit 6).
- hvis du har alvorlig allergi over for mælkeprotein.
- hvis du er i risiko for for tidlig fødsel eller truende abort.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ventolin. Tal med lægen hvis du har

- sukkersyge.
- forhøjet stofskifte.
- svære hjertelidelser som hjerte-kar-sygdom, nedsat hjertefunktion, uregelmæssig hjerterytme eller brystsmærter.
- svær astma, da der er risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin,

astmamedicin som theophyllin eller binyrebarkhormon.

- veer, da Ventolin kan hæmme disse.

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Ventolin stiger. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed. Ligeledes bør du kontakte lægen hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer.

Kontakt øjeblikkeligt lægen ved pludselig og tiltagende forværring af dine astma-symptomer.

Du bør gå til regelmæssig kontrol af din lungefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ventolin. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Ventolin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (vanddrivende midler eller beta-blokkere f.eks. propranolol).
- inflammation (binyrbarkhormon)
- andre lægemidler mod astma (theophyllin).
- depression eller parkinson (MAO-hæmmer)

Frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventolin efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Ventolin efter aftale med lægen. Ventolin går over i modermælken.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Ventolin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ventolin indeholder lactosemonohydrat

Ventolin indeholder lactose (indeholder også mælkeproteiner). Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ventolin

Tag altid Ventolin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn fra 4 år

Pludselig opstået åndenød:

1 inhalation (0,2 mg) ved behov - dog højst 4 gange daglig.

Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelsesudløst astma:

1 inhalation (0,2 mg) 15-30 minutter før udsættelse for den allergi-udløsende faktor eller før anstrengelse - dog højst 4 gange daglig.

Kronisk behandling:

1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig.

Ventolin inhalationspulver virker i 4-6 timer.


Da der kan være bivirkninger forbundet med for høj/hyppig dosering, bør dosis eller doseringshyppighed kun øges i samråd med lægen.

Brugsanvisning


- Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper, som den skal.
- Diskos indeholder et folieblisterbånd med Ventolin inhalationspulver.
- Diskos er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos tom.

Sådan bruger du Ventolin

1. Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund – til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.



2. Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund – til det siger klik. Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.




Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.

3. Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos.
4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden - ikke gennem næsen. Tag Diskos væk fra munden. Hold vejret i ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.



5. Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt – indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.



Diskos er nu klar til brug igen. Gentag punkt 1-5, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis.

Rengøring af Diskos

Tør mundstykket af med en tør klud.

Hvis du har taget for meget Ventolin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ventolin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer:

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).
- Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktacidose) som kan give kvalme og opkastning. Lægen bør kontrollere din laktatindhold i blodet.
- Kvalme, opkast og hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (hyperglykæmi) især hos børn, når overdosis af Ventolin er indtaget gennem munden. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.

- Rysten.
- Uro og rastløshed.

Hvis du har glemt at bruge Ventolin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis (inhalation).

Hvis du holder op med at bruge Ventolin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger der kan medføre behov for omgående stop af behandling: Udslæt (nældefeber) og hævelser, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald / Åndenød som kan kræve omgående behandling. Andre alvorlige bivirkninger kan være uregelmæssig puls, svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældne)

- Åndenød, angst, brystsmerte med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Ring evt. 112.
- Rysten.
- Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hjerteranken.
- Irritation i mund og svelg.
- Muskelkrampe.
- Rastløs uro.
- Svimmelhed.

Sjældne bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed pga. lavt blodtryk.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Uro og rastløshed.

- Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Ekstra hjerteslag.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Ventolin utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Ventolin ved temperaturer over 30 °C. Tag ikke Ventolin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventolin indeholder:

Aktivt stof : Salbutamol som salbutamol-sulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelse Udseende

Diskos er en blå og grøn plasticbeholder med pvc-lamineret folieblisterbånd med inhalationspulver i 60 afdelte doser.

Pakningsstørrelse

Ventolin fås i en pakningsstørrelse á 60 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ventolin svarer til Ventoline.

Ventolin® og Diskos® er registrerede varemærker, der tilhører Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2017.