

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

100 mg/12,5 mg, Filmovertrukne tabletter

Losartankalium/hydrochlorthiazid

11-2012
P189975-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
3. Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist (losartankalium) og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid). Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 anvendes til behandling af essentiel hypertension (forhøjet blodtryk).

Lægen kan have givet dig Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LOSARTANKALIUM/HYDROCHLORTHIAZID 2CARE4

Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for losartankalium, sulfonamid-afledte stoffer (som hydrochlorthiazid) eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium, eller højt indhold af kalcium (kalk) i blodet, som ikke kan forbedres ved behandling.
- har øget indhold af urinsyre i blodet (f.eks. ved urinsyreigt).
- har alvorligt nedsat leverfunktion, galdestop, reduceret galdestrøm.
- er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten - se afsnittet "Graviditet og amning").
- har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis din urinudskillelse er næsten helt ophævet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

- Tal med lægen inden du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 hvis du:
- tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge.
 - tager vanddrivende medicin.
 - er på saltbegrænset diæt.
 - kaster/har kastet voldsomt op eller har/har haft kraftig diarré.
 - har nedsat nyrefunktion.
 - har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne (nyrearteriostenose), kun har én velfungerende nyre eller er nyretransplanteret.
 - har eller har haft nedsat leverfunktion.
 - har primær hyperaldosteronisme (øget udskillelse af binyrebarkhormonet aldosteron).
 - har hjertesygdom med forsnævring af blodkar eller sygdom i hjernens blodkar.
 - har nedsat hjertefunktion.
 - har aorta- eller mitralklapstenose (forsnævring af hjerteklapperne eller hypertrofisk kardiomyopati (en sygdom der medfører fortykkelse af hjertemuskulaturen).
 - er gravid. Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (Se afsnittet "Graviditet og amning").
 - har sukkersyge.
 - hvis du skal bedøves (også hos tandlægen) eller opereres eller du skal have foretaget prøver af parathyroideafunktionen (biskjoldbruskkirtlen) skal du fortælle din læge eller sundhedspersonalet at du tager losartankalium og hydrochlorthiazid.
 - har øget indhold af urinsyre i blodet eller urinsyreigt
 - har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som kan medføre ledsmerter, hududslæt, og feber (systemisk lupus erythematosus).
 - Har højt indhold af kalcium eller lavt indhold af kalium, eller hvis du er på diæt med lavt kalium.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Kaliumtilskud, kaliumbesparende medicin eller kaliumholdige salterstatninger.
- Rifampicin, medicin til behandling af tuberkulose (TB).
- Medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. fluconazol).
- Non-steroide antiinflammatoriske smertestillende midler (såsom ibuprofen, naproxen eller diclofenac), COX 2-hæmmere (såsom celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib) eller acetylsalicylsyre.
- Barbiturater, som er sløvende midler, der kan bruges i behandling af søvnløshed eller epilepsi.
- Medicin, der kan medføre for lavt blodtryk, såsom tricykliske antidepressive midler, antipsykotiske midler (f.eks. chlorpromazin, thioridazin, sultoprid, haloperidol), baclofen og amifostin.
- Narkotiske stoffer, morfinlignende stoffer mod stærke smerter.
- Medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol)
- medicin mod sukkersyge, inklusive orale midler til sænkning af blodsukker- og insulinniveauet, såsom metformin.
- Andre blodtrykssænkende midler.
- Andre diuretika (vanddrivende midler).
- Visse afføringsmidler.
- Gigtmedicin, såsom probenecid, sulfipyrazon eller allopurinol.
- Kræftmedicin (f.eks. cyclophosphamid).
- Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.
- Medicin, der hæmmer immunforsvaret (f.eks. ciclosporin, methotrexat).
- Resiner, der bruges til at sænke høje kolesterolværdier, såsom colestyramin og colestipolresiner.
- ACTH, der bruges til at undersøge, om dine binyrer fungerer normalt.
- Kortikosteroider, der bruges mod forskellige tilstande, inklusive gigt (rheumatisme), betændelser i led (arthritis), allergiske tilstande, visse hudsygdomme, astma og visse blodsygdomme.
- "Pressoraminer" (midler, der virker på blodtrykket), såsom adrenalin, mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier.
- "Antikolinergika" (f.eks. biperidin mod parkinson eller atropin)
- Litium, en medicin til behandling af visse mentale forstyrrelser, bør ikke tages uden grundig vejledning fra lægen.
- Kalktilskud
- Carbamazepin, medicin til behandling af epilepsi.

Informér også lægen om, at du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, hvis du skal have et jodholdigt kontrastmiddel.

Brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 med et glas vand. Du kan tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal helst ikke drikke alkohol, imens du tager disse tabletter; alkohol og Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan øge hinandens virkning. Diætsalt i store mængder kan modvirke virkningen af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, da hydrochlorthiazid går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger som svimmelhed og døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LOSARTANKALIUM/HYDROCHLORTHIAZID 2CARE4

Tag altid Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 frarådes til patienter i dialyse. Væske og/eller natriummangel bør korrigeres før brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4.

Den sædvanlige dosis er

Forhøjet blodtryk

Den sædvanlige dosis til de fleste patienter med forhøjet blodtryk er 50mg/12,5 mg dagligt. Dosis kan øges til 100mg/25 mg dagligt. Den højeste daglige dosis er 100 mg/25 mg én gang dagligt.

Du skal tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 med et glas vand og kan tages sammen med andet blodtryksnedsættende medicin. Generelt opnås den blodtryksnedsænkende virkning inden for 3-4 uger efter behandlingsstart.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 til alle de anførte doseringer.

Ældre

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, hurtig puls, langsom puls, svaghed, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed, forvirring, tørst, svimmelhed og besvimelse pga dehydrering.

Hvis du har glemt at tage

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Hvis du har glemt en dosis Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter, så spring den glemte dosis Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 filmovertrukne tabletter over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføring af produktet:

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Alvorlig bivirkning:

- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlig bivirkning:

- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet.
- Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Disse yderligere bivirkninger er set for hvert af de aktive stoffer alene:

Losartan

Alvorlige bivirkninger

- Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
- Søvnliggende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.
 - Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 - Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 - Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 - Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112.

- Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
- Søvnløshed.
 - Hovedpine, svimmelhed.
 - Hoste, øvre luftvejsinfektion, tilstoppet næse, bihulebetændelse.
 - Mavesmerter, kvalme, diarré, sure opstød / halsbrand.
 - Muskelkramper, muskelsmerter, rygsmerter og smerter i benene.
 - Kraftsløshed, svaghed og træthed.
 - Smerter i brystet.
 - Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Let faldende blodprocent og antallet af røde blodlegemer.

- Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Hudblødninger, mavesmerter, ledsmerter og sort/mørkfarvet afføring (Henoch-Shcñlein purpura).
 - Gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Appetitmangel/madlede.
 - Forhøjet indhold af urinsyre i blodet eller urinsyregigt som giver smertefulde ledbetændelser der optræder i anfald.
 - Angst, angsttilstande, panikangst, forvirring.
 - Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Unormale drømme, søvnforstyrrelser og hukommelsessvækkelse.
 - Nervøsitet, rysten, svimmelhed, migræne
 - Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 - Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 - Sløret syn, brænden/stikken i øjnene, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd og nedsat synsskarphed.
 - Susen for ørerne (tinnitus).
 - Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 - Smerter i brystregionen.
 - Hjertebanken.
 - Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
 - Svælgkatar / irritation og gener i svelget.
 - Betændelse i strubehovedet.
 - Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Bronkitis, vand i lungerne (som medfører besvær med at trække vejret).
 - Tilstoppet næse, næseblod, forkølelse med løbenæse og nysen.
 - Forstoppelse, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, kvalme og opkastninger.
 - Tandsmerter, mundtørhed.
 - Hårtab.
 - Eksem eller irritation af huden / udslæt, tør hud, kløe, rødmen af huden, nældefeber og øget følsomhed af huden for lys.
 - Svedtendens.
 - Smerter i armene, hofterne, skuldrene og knæene.

- Knogle-, led-, og muskelsmerter, stivhed.
- Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
- Kronisk smertetilstand med uspecifikke smerter i muskler og skelet (fibromyalgi).
- Natlig vandladning, hyppig vandladning og urinvejsinfektion.
- Nedsat sexlyst, impotens.
- Hævelse af ansigtet.
- Feber.
- Let stigning i urinstof og koncentrationen af kreatinin i blodet

- Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

- Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.
- Stigning i leverfunktionsprøver.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Unormal leverfunktion.

Hydrochlorthiazid

Alvorlige bivirkninger

- Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 - Træthed og blegthed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 - Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 - Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 - Lungebetændelse. Kontakt lægen.
 - Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 - Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 - Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 - Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 - Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

- Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

- Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.
- Hovedpine

- Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 - Mindre blødning i hud og slimhinder.
 - Appetitmangel/madlede.
 - Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 - Urinsyregigt. Smertefulde ledbetændelser der kommer i anfald.
 - Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 - Søvnløshed.
 - Forbigående sløret syn og gulsyn (hvor alt ser gult ud).
 - Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 - Vejrtrækningsbesvær.
 - Betændelse i en spytkirtel.
 - Maveirritation, kramper, kvalme, opkastning, forstoppelse og diarré.
 - Øget følsomhed af huden for lys.
 - Nældefeber.
 - Muskelkramper.
 - Sukker i urinen.
 - Funktionsforstyrrelse af nyrerne.
 - Feber, svimmelhed.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 ved temperaturer over 30 °C. Opbevar Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 i original yderpakning, da det er følsomt for fugt. Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktive stoffer: 100 mg losartankalium svarende til 91,52 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid. Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, prægelatineret majsstivelse, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 4000, talcum og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100 mg/12,5 mg er hvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelser

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 100 mg/12,5 mg 28 og 98 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 svarer til Cozaar® Comp.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2012