



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Donepezil Pfizer **Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg** Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Donepezil Pfizer til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezil Pfizer
3. Sådan skal De tage Donepezil Pfizer
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Donepezil Pfizer hører til den gruppe af lægemidler, som hedder acetylcholinesterase-hæmmere. Donepezil Pfizer øger mængden af stoffet acetylcholin, som indgår i hjernens hukommelsesfunktion ved at nedsætte den hastighed, som acetylcholin omdannes med.

Donepezil Pfizer bruges til at behandle symptomer på demens hos patienter med mild til moderat svær grad af Alzheimers sygdom. Symptomer på demens er tiltagende hukommelsestab, forvirring og ændring i adfærd. Dette gør, at patienter med Alzheimers sygdom får sværere og sværere ved at udføre normale dagligdags aktiviteter.

Donepezil Pfizer bruges kun til behandling af voksne.

Lægen kan have givet Dem Donepezil Pfizer for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Donepezil Pfizer

Tag ikke Donepezil Pfizer:

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for donepezil eller piperidin-derivater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil Pfizer, beskrevet under afsnit 6

Vær ekstra forsigtig med at tage Donepezil Pfizer

Tal med lægen eller apoteket, inden De tager Donepezil Pfizer, hvis De har eller har haft:

- mavesår eller sår på tolvfingertarmen
- krampeanfald eller kramper

- en hjertelidelse (uregelmæssige eller meget langsomme hjerteslag)
- astma eller anden længerevarende lungesygdom
- leverproblemer eller leverbetændelse
- vandladningsbesvær eller mild nyresygdom

Fortæl det også til lægen, hvis De er gravid, eller tror De er gravid.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin, eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det gælder også medicin, som De skal tage fremover, hvis De fortsætter med at bruge Donepezil Pfizer. Dette er fordi, denne medicin kan påvirke virkningen af Donepezil Pfizer.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

- anden medicin mod Alzheimers sygdom, f.eks. galantamin
- smertestillende medicin eller medicin mod gigt, f.eks. acetylsalicylsyre, nonsteroidale antiinflammatoriske stoffer (NSAID) som ibuprofen eller diclofenacnatrium
- antikolinerge midler, f.eks. tolterodin
- medicin mod infektion (antibiotika), f.eks. erythromycin, rifampicin
- medicin mod svamp, f.eks. ketoconazol
- medicin mod depression, f.eks. fluoxetin
- medicin mod kramper, f.eks. phenytoin eller carbamazepin
- medicin mod hjertelidelser, f.eks. quinidin, betablokkere (propranolol og atenolol)
- muskelafslappende medicin, f.eks. diazepam, succinylcholin
- fuld bedøvelse
- medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. urtemedicin

Hvis De skal opereres og i fuld bedøvelse, skal De fortælle lægen eller sundhedspersonalet at De bruger Donepezil Pfizer. Medicinen kan påvirke den mængde bedøvelse, der skal bruges.

De kan bruge Donepezil Pfizer hvis De har nyresygdom eller mild til moderat leversygdom. Tal med lægen, hvis De har nyre- eller leversygdom. Patienter med svær leversygdom bør ikke tage Donepezil Pfizer.

Fortæl Deres læge navnet på den pårørende eller omsorgsperson, der skal hjælpe Dem med at tage medicinen.

Brug af Donepezil Pfizer sammen med mad og drikke

De kan tage Donepezil Pfizer i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

De bør ikke drikke alkohol, da alkohol kan påvirke Donepezil Pfizers virkning.

Graviditet og amning

De må ikke tage Donepezil Pfizer, hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, hvis De er gravid eller tror De er gravid, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Demens kan svække evnen til at køre eller at arbejde med maskiner. De må kun foretage disse aktiviteter, hvis Deres læge mener, at det er sikkert. Denne medicin kan give træthed, svimmelhed og muskelkramper. Hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Donepezil Pfizer

Donepezil Pfizer indeholder lactose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Donepezil Pfizer

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Normalt starter De med at tage 5 mg (en hvid tablet) hver aften. Efter 1 måned kan lægen øge dosis til 10 mg (en gul tablet) hver aften.

Synk tabletten med et glas vand om aftenen inden sengetid.

Hvilken styrke tablet De skal tage, afhænger af, hvor længe De har taget denne medicin og hvad lægen anbefaler. De må højst tage 10 mg dagligt.

Tag altid Donepezil Pfizer nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. De må ikke selv ændre dosis uden at have talt med lægen.

Hvor længe skal De tage Donepezil Pfizer?

Deres læge eller apoteket vil fortælle Dem, hvor længe De skal tage tabletterne. Deres læge vil regelmæssigt tilse Dem og vurdere behandlingen og Deres symptomer.

Hvis De holder op med at tage Donepezil Pfizer

De må ikke stoppe behandlingen, medmindre Deres læge har bedt Dem om det. Hvis De stopper med at tage Donepezil Pfizer, vil fordelene ved behandlingen gradvist forsvinde.

Hvis De har taget for mange Donepezil Pfizer

Tag kun 1 tablet om dagen. Kontakt straks Deres læge, hvis De har taget mere af Donepezil Pfizer end De skulle. Hvis De ikke kan kontakte Deres læge, så kontakt straks skadestuen. Tag altid resten af tabletterne og kartonen med til hospitalet, så lægen ved hvad De har taget.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning, savlen, sveden, langsom hjerterytme, lavt blodtryk (giver en følelse af at være omtåget eller svimmel når man står op), vejrtrækningsbesvær, besvimelse og krampeanfald eller kramper.

Hvis De har glemt at tage Donepezil Pfizer

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De blot tage en tablet næste dag på det sædvanlige tidspunkt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis De glemmer at tage medicinen i mere end en uge, så kontakt lægen, før De tager mere medicin.

4. Bivirkninger

Donepezil Pfizer kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne, der er nævnt her, er oplevet af patienter, der har taget Donepezil Pfizer. Fortæl det til lægen, hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, mens De tager Donepezil Pfizer.

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl det straks til lægen, hvis De oplever nogle af disse alvorlige bivirkninger. De kan have brug for øjeblikkelig lægehjælp.

- leverskade, f.eks. leverbetændelse. Symptomerne på leverbetændelse er kvalme eller opkastning, appetitløshed, generel utilpashed, feber, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene samt mørk urin (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
- mavesår eller sår på tolvfingertarmen. Symptomer på mavesår og sår på tolvfingertarmen er mavesmerter og mavegener (fordøjelsesbesvær) mellem navlen og brystbenet (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
- blødning i maven eller tarmene. Dette kan give sort tjærelignende afføring eller synligt blod fra endetarmen (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- o krampeanfald eller kramper (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- o diarré
- o kvalme eller opkastning
- o hovedpine

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- o muskelkramper
- o træthed
- o søvnløshed
- o snue
- o appetitløshed
- o hallucinationer (se eller høre ting som ikke findes i virkeligheden)
- o unormale drømme og mareridt
- o uro
- o aggressiv opførsel
- o besvimelsesanfald
- o svimmelhed
- o mavegener
- o udslæt
- o kløe
- o inkontinens
- o smerter
- o ulykker (patienter kan være mere tilbøjelige til at falde og at komme til skade ved uheld)

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- o langsom hjerterytme

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- o stivhed, rysten eller ukontrollable bevægelser, især af ansigtet og tungen, men også af arme og ben.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar ikke Donepezil Pfizer ved temperaturer over 30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Donepezil Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen og blister eller beholder efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Hvis Deres læge fortæller Dem, at De skal stoppe med at tage tabletterne, skal De altid aflevere medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Donepezil Pfizer filmovertrukne indeholder:

- Aktivt stof: donepezilhydrochlorid. 1 tablet indeholder 5 eller 10 mg donepezilhydrochlorid.

- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; mikrokrySTALLinsk cellulose; hypromellose; magnesiumstearat. Filmovertrukket indeholder: hypromellose; talcum; macrogol; farvestoffet titandioxid (E171) og i 10 mg tabletten også farvestoffet gul jernoxid (E172).

Udseende

- Tabletterne med 5 mg er hvide tabletter, mærket 5 på den ene side.
- Tabletterne med 10 mg er gule tabletter, mærket 10 på den ene side.

Pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 og 120 tabletter, og i beholdere med 28, 30 eller 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaveren af markedsføringstilladelsen**

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Eisai Manufacturing Limited, Hatfield, Storbritannien.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Belgien, France, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Sverige og Østrig: Donepezil Pfizer

England: Donepezil

Portugal: Donepezilo Pfizer

Tyskland: Donepezilhydrochlorid

Denne indlægsseddel blev senest opdateret september 2011

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk