

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Antepsin 200 mg/ml oral suspension

Sucralfat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Antepsin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Antepsin
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antepsin
3. Sådan skal du tage Antepsin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Antepsin er et middel, som anvendes ved sår i spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen. Det virker lokalt i mave-tarmkanalen og optages ikke i kroppen. Antepsin lægger en beskyttende hinde på såret. Hinden opretholdes i flere timer og er uigennemtrængelig for mavesyre/saltsyre. På denne måde fremskyndes helingsprocessen.

Antepsin anvendes til:

- Behandling af sår på tolvfingertarm og mavesæk
- Behandling af spiserørskatar (sure opstød og halsbrand)
- Forebyggelse af stress-mavesår hos akut syge

Lægen kan have givet dig Antepsin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ANTEPSIN

Tag ikke Antepsin hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for sucralfat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Antepsin

Hvis dine nyrer ikke fungerer normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Antepsin. Hvis du har synkebesvær, kan der forekomme fejlsynkning til lungerne, når du tager medicinen. Antepsin må ikke gives i en blodåre.

Du må kun tage Antepsin mod mavesår efter aftale med lægen.

Der er set tilfælde af dannelse af ufordøjelige klumper i mavesækken efter administration af sucralfat hos patienter, der har problemer med tømningen af mavesækken. Dette kan opstå efter operation, behandling med visse lægemidler eller hvis man har en sygdom, der nedsætter bevægeligheden i mave-tarm-kanalen.

Brug hos børn og teenagere under 14 år

Antepsin anbefales ikke til børn og teenagere under 14 år pga. manglende dokumentation.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Tetracycliner og fluorquinolon (antibiotika)
- Digoxin og quinidin (midler mod nedsat hjertefunktion)
- Phenytoin (middel mod epilepsi)
- Cimetidin og ranitidin (midler mod for megen mavesyre)
- Ketoconazol (middel mod svampeinfektion)
- Theophyllin (middel mod astma)
- Levothyroxin (middel ved nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen)
- Warfarin (blodfortyndende middel)
- Sulpirid (mod psykoser)

Der bør gå 2 timer mellem du tager disse lægemidler og Antepsin.

Der bør gå 30 minutter mellem du tager Antepsin og andre midler mod for meget mavesyre.

Hvis du får medicin, der indeholder citrat, kan du få for meget aluminium i blodet. Tal med din læge om ovenstående punkter inden du tager Antepsin.

Brug af Antepsin sammen med mad og drikke

Antepsin skal tages ½-1 time før måltiderne samt før sengetid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Antepsin efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringerne med Antepsin er begrænsede. Tal med din læge inden du tager Antepsin, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antepsin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Antepsin

Antepsin indeholder natriummethylparahydroxybenzoat (E219) og natriumpropylparahydroxybenzoat (E217). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ANTEPSIN

Tag altid Antepsin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Antepsin skal indtages ½-1 time før måltiderne samt før sengetid. Suspensionen omrystes før brug. Hvis Antepsin gives gennem en mavesonde, skal denne efterskylles med 10-15 ml vand for ikke at tilstoppe.

Antepsin må ikke gives i en blodåre.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Sår på tolvfingertarmen:

5 ml 4 gange dagligt, eller 10 ml 2 gange dagligt.

Ved langtidsbehandling kan dosis nedsættes til 5 ml 2 gange dagligt.

Mavesår:

5 ml 4 gange dagligt.

Ved langtidsbehandling kan dosis nedsættes til 5 ml 2 gange dagligt.

Spiserørskatar (sure opstød og halsbrand):

5 ml 4 gange dagligt.

Forebyggelse af stress-mavesår hos alvorligt akut syge:

5 ml 4 gange dagligt.

Brug hos børn og teenagere

Antepsin anbefales ikke til børn og teenagere under 14 år pga. manglende dokumentation.

Hvis du har taget for meget Antepsin oral suspension

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Antepsin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering: mavesmerter, kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Antepsin

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis det er tidspunktet for næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Antepsin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
Mundtørhed, kvalme, eksantem og nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Der kan dannes ufordøjelige klumper i mavesæk eller tarm (besoarsten) (se afsnit 2).

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data):

Overfølsomhedsreaktioner, som kan vise sig ved hævelse af ansigt, øjne, læber og/eller svælg, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), hududslæt og kløe.

Små mængder aluminium kan optages fra mave-tarm-kanalen og ophobes i kroppen. Der er set knoglesygdomme, hjernelidelser og blodmangel hos patienter med kronisk nedsat nyrefunktion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Antepsin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Antepsin 200 mg/ml oral suspension indeholder:

Aktivt stof: Sucralfat. 1 milliliter oral suspension indeholder 200 mg sucralfat. 1 teskefuld (5 ml) indeholder 1 g sucralfat.

Øvrige indholdsstoffer: Glycerol; natriummethylparahydroxybenzoat (E219);

natriumpropylparahydroxybenzoat (E217); saccharinnatrium (E954);

natriumdihydrogenphosphatdihydrat (E954); xanthangummi (E415); karamel-essens (E150); anis-essens; rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Antepsin er en hvid, tyktflydende suspension.

Pakningsstørrelser: Antepsin 200 mg/ml oral suspension fås i en 300 ml plastflaske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo
Finland

Repræsentant i Danmark:

Orion Pharma A/S
Møllevej 9
Dk-2990 Nivå
Tlf. 4912 6600
opdk@orionpharma.com

Fremstiller:

Orion Corporation
Vollt Katu 8
70700 Kuopie
Finland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2012