

ETHINYLESTRADIOL/LEVONORGESTREL A-PHARMA

30/150 mikrogram overtrukne tabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

I denne information er der oplysninger om:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma
- Sådan skal du tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma er en lavdosis p-pille af kombinationstypen, der indeholder små doser af to forskellige kvindelige hormoner, levonorgestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Alle aktive tabletter i pakken indeholder samme mængde af begge hormoner. P-pillen forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Den påvirker også slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere.

Du kan bruge Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma til at undgå svangerskab.

Lægen kan have givet dig Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma

Tag ikke Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, hvis du har eller har haft:

- allergi over for ethinylestradiol eller levonorgestrel eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma.
- årebetændelse, blodprop i lunge, hjerte eller hjerne.
- hjertekramper (angina pectoris).
- hjerfelidelser med sygdom i hjerteklapperne og rytmeforstyrrelser.
- migræne med f.eks. synsforstyrrelser, taleforstyrrelser eller svaghed eller følelsesløshed et sted i kroppen.
- diabetes med følgesygdomme.
- en arvelig eller anden kendt risiko for blodpropper (se særlige forholdsregler).
- alvorligt forhøjet blodtryk.
- lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer.
- svulster i leveren eller alvorlig leversygdom med nedsat leverfunktion.
- kræft i brystet eller livmoderen.
- blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Hvis du får en af disse sygdomme for første gang, mens du bruger p-pillerne, skal du straks stoppe med p-pillerne og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden type svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom eller pessar).

Advarsler og forsigtighedsregler

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma beskytter ikke mod hiv-infektion (AIDS) eller kønssygdomme. Det er vigtigt, at du taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, før du begynder at tage p-pillerne. Inden du begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum, bør du blive undersøgt grundigt af din læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte måling af blodtrykket, undersøgelse af brystet og en gynækologisk undersøgelse.

P-piller og blodpropper:

Din risiko for at få blodpropper er lidt større, mens du bruger Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, altså p-piller der indeholder 2 slags hormoner: østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år, hvor du bruger den slags p-piller. Det er ligegyldigt, hvilken slags kombinations-p-piller, du bruger.

Risikoen for at få blodpropper bliver større, hvis du:

- er over 35 år.
- ryger (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder over 35 år).
- har diabetes.
- er overvægtig.
- har for højt blodtryk.
- har sygdom i hjerteklapperne eller forstyrrelser i hjerterytmten.
- har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller et slagtilfælde.
- har migræne.
- selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider) i blodet. Risikoen for at få en betændelse i bugspytkirtlen kan være øget ved forhøjet fedt i blodet.

Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet fra musklerne og andre steder i kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger inde mellem musklerne i læggen eller låret. Blodpropperne kan rive sig løs og føres med blodet til lungernes pulsårer. De stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større eller mindre del af lungen. Det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en sådan blodprop i lungen være dødelig. Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger p-piller og endnu større hos gravide. Hvis man bruger p-piller, er risikoen desuden afhængig af, hvordan p-pillen er sammensat.

Ud af 100.000 gravide får ca. 60 en blodprop i blodårerne.
Ud af 100, der får en blodprop i blodårerne, dør en eller to.

Du har større risiko for at få blodpropper i blodårerne, når du bruger Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, end hvis du bruger p-piller med mindre indhold af østrogenhormonet ethinylestradiol. Der kan også dannes blodpropper andre steder i kroppen, nemlig i hjertet, hjernen, øjet, nyrerne eller leveren. Men det er meget sjældent ved brug af p-piller eller under graviditeten.

Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker følgende tegn på blodpropper:

- hoste især med sting i siden.
- stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm.
- åndenød.
- unormal kraftig eller vedvarende hovedpine eller migræneanfald.
- delvis eller fuldstændig blindhed eller dobbeltsyn.
- utydelig tale eller manglende evne til at tale.
- pludselige forstyrrelser i din høre-, lugte- eller smagssans.
- svimmelhed eller besvimelsesanfald.
- mathed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
- stærke mavesmerter.
- smerter og/eller hævelse i det ene ben.

P-piller og kræft:

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos andre kvinder på samme alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de første 10 år, efter at man er ophørt med p-piller. Man ved dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. Kvinder, der bruger p-piller får oftere undersøgt brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.

Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster. Yderst sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.

Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder, der bruger p-piller oftere bliver undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end dem, der bruger andre svanger-skabsforebyggende midler som f.eks. kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt virus (humant papillomatøst virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere.

Kontakt lægen eller apoteket, før du begynder at bruge p-piller, hvis du:

- selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
- har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
- har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohn's sygdom eller ulcerøs colitis).
- har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus).
- har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyrsvigt (hæmolytisk uræmisk syndrom).
- har en arvelig form for blodmangel (segicelleanæmi).
- har en sygdom, der kom første gang eller blev forværret under graviditet eller ved tidligere brug af hormoner (f.eks. døvhed, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en hudsygdom kaldet svangerskabsherpes, en sjælden sygdom i nervesystemet kaldet Sydenham's chorea).
- har gullig-brune skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I så fald skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller gå i solarium

Kontakt din læge snarest muligt, hvis du mærker en knude i brystet eller bemærker nogle forandringer i din krop eller dit helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne indlægsseddel.

Når du tager p-piller, kan du få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis du stadig har uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør du kontakte lægen (nogle kvinder får ikke blødning i den tablefri periode).

Hvis du tager p-pillerne efter anvisningen, er det usandsynligt, at du bliver gravid. Hvis du ikke har taget pillerne, som du skal, eller du ikke får blødning efter to perioder med p-piller, skal det udelukkes, at du er gravid, før du fortsætter med p-piller.

Kontakt din læge, hvis du får alvorlig diarré eller begynder at bruge anden medicin.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du bruger Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du bør fortælle din læge om dette, især hvis det er:

- medicin mod epilepsi (barbiturater, topiramat, phenytoin, primidon, carbamezapin, felbamat, oxcarbazepin, lamotrigin).
- medicin mod betændelse (ampicillin, rifampicin, tetracyclin).
- medicin mod hiv-virus (ritonavir).
- medicin mod svamp (griseofulvin).
- medicin efter transplantation (ciclosporin).
- naturlægemidler der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

Flere af ovennævnte lægemidler kan nedsætte den svangerskabsforebyggende virkning af Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma. Du kan få blødning i perioden og blive gravid. Det er vigtigt, at du taler med lægen om og hvor længe du skal benytte en anden type svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom eller pessar).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, hvis du er gravid. Hvis du tror, du er gravid, skal du omgående stoppe med at tage pillerne og bruge en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil du er sikker på, om du er gravid eller ej.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma indeholder lactose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma

Tag altid Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Pakningen med Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma indeholder 21 p-piller. På blisterpakningen er hver p-pille markeret med den ugedag, hvor den skal tages. Tag p-pillerne på omtrent samme tidspunkt af døgnnet med lidt vand. Følg pilenes retning på blisterpakningen, indtil alle 21 p-piller er taget. De næste 7 dage skal du ikke tage nogen p-piller. I løbet af disse dage bør du få din menstruation. Normalt starter menstruationen på 2.-3. dagen efter den sidste p-pille er taget. På 8. dagen starter du med en ny blisterpakning, også selv om din menstruation fortsætter. Det betyder, at du altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får din menstruation på samme tid med 4 ugers mellemrum.

Sådan starter du på din første Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma blisterpakning

Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den sidste måned.

Den første p-pille tages på menstruationens første dag dvs. 1. blødningsdag. Ønsker du at starte på dine p-piller på menstruationens 2.-5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (med f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage.

Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen

Du kan starte med at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma dagen efter den p-pillefrie periode (eller dagen efter den sidste virkningsløse p-pille, hvis din forrige blisterpakning indeholdt virkningsløse p-piller, d.v.s. 28 stk.). Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.

Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (minipille)

Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Ethinylestradiol/ Levonorgestrel A-Pharma næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (med f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.

Ved skift fra injektion, implantat eller fra en spiral, der frigiver gestagen

Du kan starte på Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma den dag, du har planlagt at få din næste injektion eller den dag, dit implantat eller din spiral fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (med f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage du tager p-pillerne.

Efter fødsel

Lige efter fødslen vil din læge måske råde dig til at vente med at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma til efter din første normale menstruation. Nogle gange kan du starte før. Spørg din læge. Ønsker du at bruge Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, mens du ammer, så spørg din læge til råds først. Husk, at du kan blive gravid, selv om du ikke har fået din menstruation igen og du stadig ammer.

Efter abort

Din læge kan rådgive dig.

Hvis du har taget for mange Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis er kvalme, opkastning og småblødning fra skeden hos unge piger.

Hvis du har glemt at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma

• Hvis der er gået mindre end 12 timer, siden du skulle have taget din sidste p-pille, er sikkerheden stadig uændret. Tag p-pillen, så snart du husker det. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt, som om intet var hændt.

• Hvis der er gået mere end 12 timer, siden du skulle have taget din sidste p-pille, er sikkerheden muligvis nedsat. Jo flere p-piller, du har glemt, desto større er usikkerheden. Hvis de glemte p-piller hører til 1. uge eller 3. uge af en blisterpakning, er risikoen for at blive gravid væsentlig forøget. Du bør derfor følge nedenstående anvisninger (se også skema).

Mere end 1 p-pille er glemt

Spørg din læge til råds.

1 p-pille er glemt i uge 1

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de næste 7 dage. Hvis du har haft samleje i ugen før du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid. Kontakt derfor straks din læge.

1 p-pille er glemt i uge 2

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. P-pillernes sikkerhed er uændret, og du behøver ikke at beskytte dig ekstra mod graviditet.

1 p-pille er glemt i uge 3

Du kan vælge mellem en af følgende muligheder uden at bruge yderligere form for svangerskabsforebyggelse.

1. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. Start straks på den næste blisterpakning uden nogen pause mellem pakningerne. Du får sandsynligvis ingen menstruation før efter den anden blisterpakning. Men du kan få pletblødninger eller gennembruds-blødninger, mens du tager p-pillerne.

Eller

2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri periode på 7 dage eller mindre inkl. den dag, du glemte din p-pille. Fortsæt med den næste blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste blisterpakning på den samme ugedag, som du plejer.

• Hvis du har glemt at tage p-piller i en blisterpakning og ikke får din forventede blødning i den p-pillefri periode, er du måske blevet gravid. Kontakt din læge, før du starter på den næste blisterpakning.

..... Du lider af mave-tarmforstyrrelser (f.eks. opkastning, alvorlig diarré)

Hvis du kaster op eller har alvorlig diarré, er der ingen garanti for, at p-pillen har nået at virke. Hvis du kaster op kort tid (3-4 timer) efter, at du har taget din Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma-pille, svarer dette til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. Kontakt din læge, hvis du har alvorlig diarré.

..... Du ønsker at udskyde din menstruation

Du kan udskyde din menstruation, hvis du straks fortsætter med den nye blisterpakning uden en p-pillefri periode. Når du ønsker at få din menstruation, stopper du med at tage p-pillerne. I perioden, hvor du udskyder din menstruation, kan du få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den sædvanlige 7 dages p-pillefrie periode.

..... Du ønsker at ændre ugedagen for din 1. blødningsdag

Hvis du tager dine p-piller, som foreskrevet, vil du få din menstruation på omtrent samme ugedag hver 4. uge. Hvis du ønsker at ændre denne, skal du forkorte (aldrig forlænge) den p-pillefrie periode. Hvis din menstruation f.eks. starter en fredag, og du fremover ønsker, at den skal starte en tirsdag (3 dage tidligere), start da med din næste blisterpakning 3 dage tidligere, end du plejer. Hvis den p-pillefrie periode bliver forkortet til 3 dage eller mindre, vil du måske ikke få din menstruation. Du kan få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager den næste blisterpakning.

..... Du får uventede blødninger

I de første par måneder kan alle p-piller give dig uregelmæssige blødninger (pletblødninger eller gennembrudsblødninger) mellem dine menstruationer. Måske får du brug for at bruge hygiejnebind, men fortsæt med at tage p-pillerne. Uregelmæssige blødninger stopper sædvanligvis, når din krop har vænnet sig til p-pillerne (normalt efter 3 måneder). Hvis blødningerne fortsætter, bliver kraftigere eller kommer igen, bør du kontakte din læge.

..... Du får ikke din menstruation

Hvis du har taget alle dine p-piller korrekt og ikke har kastet op eller haft alvorlig diarré eller har taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er gravid. Fortsæt med at tage dine Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma p-piller, som du plejer. Hvis du ikke får din menstruation to gange i træk, er du måske gravid. Kontakt straks din læge. Start ikke på din næste blisterpakning, før din læge har kontrolleret, at du ikke er gravid.

Hvis du holder op med at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma

Du kan når som helst stoppe med at tage Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma. Ønsker du at blive gravid, anbefales det at vente, til du har haft din første normale menstruation. Dermed får du mulighed for at beregne, hvornår barnet fødes. Hvis du ikke ønsker at blive gravid, kan du rådføre dig med din læge om andre svangerskabs-forebyggende metoder.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og taleforstyrrelser. Kontakt straks din læge eller skadestue. Ring 112.
- Brystkræft. Kontakt din læge, hvis du mærker en knude i brystet.
- Leversvulst. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter under højre ribbensbue.
- Livmoderhalskræft, der kan vise sig ved blødninger fra skeden, udflåd, smerter og blødninger i forbindelse med samleje. Kontakt lægen.
- Udslæt, feber og træthed på grund af bindevævssygdom (Lupus erythematosus). Kontakt lægen.
- Chorea (sygdom med ufrivillige, rykvisе bevægelser). Kontakt lægen.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks din læge eller skadestue.
- Galdevejssygdomme (inklusive galdesten) med stærke smerter under højre ribbensbue. Kontakt straks din læge eller skadestue.
- Udslæt med ømme, røde knuder oftest på ben og arme (erythema nodosum). Kontakt lægen.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).
- Gullig-brune skjoldede farvninger af huden, især i ansigtet (chloasma), som kan være varige.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Depression, irritabilitet.
- Nervøsitet.
- Øjenirritation ved anvendelse af kontaktlinser.
- Synsforstyrrelser.
- Kvalme
- Nedsat lyst til sex.
- Migræne.
- Hovedpine.
- Uren hud (akne).
- Brystspænding, brystsmerter.
- Uregelmæssige menstruationsblødninger, udeblivelse af menstruation, nedsat menstruationsblødning
- Vægtøgning
- Væskeophobning.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos mindre end 1 ud af 100 behandlede):

- Forhøjet blodtryk
- Opkastninger
- Arvelig døvhed (otosklerose).
- Ændringer i udflåd.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsen netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP . Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma indeholder:

Aktive indholdsstoffer: levonorgestrel 150 mikrogram og ethinylestradiol 30 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica; magnesiumstearat; talcum; majsstivelse; lactosemonohydrat; carmellosenatrium; povidon; macrogol 6000; copovidon; calciumcarbonat; saccharose og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Runde, hvide overtrukne tabletter.

Pakningsstørrelse

Ethinylestradiol/Levonorgestrel A-Pharma fås i blisterpakninger indeholdende 3 x 21 overtrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS
Usserød Kongevej 32
2970 Hørsholm

Ompakket og frigivet af:

Scanpharm A/S
Topstykket 12
3460 Birkerød

Parallelimporteret af:

A-Pharma ApS
Usserød Kongevej 32
2970 Hørsholm

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2012