

Indlægsseddel: Information til brugeren

Intestifalk® 3 mg, hårde enterokapsler

Budesonid

07-2017
P109353-3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Intestifalk
3. Sådan skal du tage Intestifalk
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Intestifalk 3 mg hårde enterokapsler indeholder det aktive stof budesonid, en type lokalt virkende steroid, der anvendes til behandling af kroniske inflammatoriske sygdomme i tarmen og leveren.

Intestifalk bruges i behandlingen af:

Crohns sygdom: Mild til moderat akut anfald af kronisk betændelse i tarmen, der påvirker den nedre del af tyndtarmen (ileum) og/eller den øvre del af tyktarmen (colon ascendens).

Bemærk: Intestifalk er ikke egnet til patienter med Crohns sygdom i den øvre mave-tarmkanal. Sommetider kan denne sygdom give symptomer uden for tarmen (f.eks. påvirkning af huden, øjnene og led), som sandsynligvis ikke vil reagere på denne medicin.

Akutte episoder af kollagen colitis

(en sygdom med kronisk betændelse i tyktarmen, som er karakteriseret ved kronisk vandig diarré).

Autoimmun hepatitis (en sygdom med kronisk leverbetændelse).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Intestifalk

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Intestifalk:

- hvis du er allergisk over for budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Intestifalk. (angivet i afsnit 6 og slutningen af afsnit 2).
- hvis du har en alvorlig leversygdom (levercirrose/leverbetændelse).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Intestifalk.

Før du begynder at tage medicinen, så fortæl din læge, hvis du har:

- Tuberkulose.
- Højt blodtryk.
- Diabetes, eller hvis diabetes er blevet diagnosticeret i din familie.
- Knogleskørhed (Osteoporose).

- Sår i maven eller i første del af tyndtarmen (mavesår).
- Øget tryk i øjet (glaukom) eller øjenproblemer, såsom uklarhed af linsen (grå stær) eller hvis glaukom er blevet diagnosticeret i din familie.
- Alvorlige leverproblemer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Intestifalk. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Typiske virkninger af kortison præparater kan forekomme, som kan påvirke alle dele af kroppen, især når du tager Intestifalk i høje doser og i længere perioder (se pkt. 4. Bivirkninger).

Yderligere forholdsregler under behandling med Intestifalk

- Undgå kontakt med mennesker, der har skoldkopper eller herpes zoster (helvedesild), hvis du aldrig har haft det. Det kunne påvirke dig alvorligt. Hvis du kommer i kontakt med skoldkopper eller helvedesild, skal du straks kontakte din læge.
- Fortæl din læge, hvis du ikke har haft mæslinger.
- Hvis du ved, at du skal vaccineres, så kontakt først din læge.
- Hvis du ved, at du skal have foretaget en operation, skal du fortælle til din læge, at du tager Intestifalk.
- Hvis du er blevet behandlet med et stærkere kortison præparat, før behandling med Intestifalk kan dine symptomer vende tilbage, når medicinen er ændret. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Intestifalk

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

- **Hjerteglykosider** såsom digoxin (medicin til behandling af hjertelidelser)
- **Diuretika** (for at fjerne overskydende væske fra kroppen)
- **Ketoconazol eller itraconazol** (til behandling af svampeinfektioner)
- **Antibiotika**, der anvendes til behandling af infektioner (såsom clarithromycin)
- **Ritonavir** (mod HIV infektioner)
- **Carbamazepin** (anvendes til behandling af epilepsi)
- **Rifampicin** (til behandling af tuberkulose)
- **Østrogener eller orale præventionsmidler**
- **Cimetidin** (anvendes til at hæmme produktionen af syre i maven).

Hvis du tager **colestyramin** (for hyperkolesterolemie (forhøjet kolesterol), som også anvendes til behandling af diarré) eller **antacida** (for fordøjelsesbesvær) samtidig med Intestifalk, skal disse lægemidler tages med **mindst 2 timers mellemrum**.

Brug af Intestifalk sammen med mad og drikke

Du må **ikke** drikke **grapefrugtjuice** samtidig med, at du tager Intestifalk, da dette kan påvirke virkningen.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Intestifalk. Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Intestifalk, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Intestifalk påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Intestifalk indeholder saccharose og lactosemonohydrat

Hver kapsel indeholder 240 mg saccharose og 12 mg lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Intestifalk

Tag altid Intestifalk nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Crohns sygdom

Voksne (over 18 år)

Tag 3 kapsler én gang daglig om morgenen eller 1 kapsel 3 gange daglig (morgen, middag og aften), medmindre din læge har fortalt dig noget andet.

Kollagen colitis

Voksne (over 18 år):

Tag én kapsel 3 gange dagligt (morgen, middag og aften), medmindre din læge har fortalt dig noget andet.

Autoimmun hepatitis

Voksne (over 18 år):

Behandling af akut betændelse: Tag én kapsel 3 gange dagligt (morgen, middag og aften), medmindre din læge beder dig om andet. Afhængigt af resultaterne af laboratorieundersøgelserne, vil din læge beslutte, hvor længe du skal tage 3 kapsler om dagen.

Vedligeholdelsesbehandling: Tag én kapsel 2 gange dagligt (morgen og aften), medmindre din læge beder dig om andet.

Afhængigt af resultaterne af laboratorieundersøgelserne, vil din læge beslutte, hvor længe du skal tage 2 kapsler per dag.

Bemærk venligst, at i de fleste tilfælde vil lægen ordinere Intestifalk sammen med azathioprin, et lægemiddel, der virker ved at undertrykke kroppens immunsystem.

Denne indlægsseddel blev senest ændret
juli 2017